



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA, IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI **COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE**  
– CAT. D.

**14/04/2022**

**PROVA PRATICA A**

**TIPO TEST 1**



### 1. Quali valutazioni assistenziali si possono porre al Paziente durante la formulazione del Piano Assistenziale Infermieristico alla visita di presa in carico

- a il signor M. riferisce un miglioramento della performance status
- b il signor M. presenta un miglioramento della performance status mediante scale validate
- c il signor M. presenta un aggravamento atteso della performance status nel prossimo mese

### 2. Procedura: aerosol terapia. Indicare la sequenza corretta delle azioni

- rimuovere la maschera e se il caso far soffiare il naso al Paziente (1)
  - verificare la prescrizione medica sul foglio della terapia (2)
  - verificare la funzionalità e stato dell'apparecchio (3)
  - collegare l'apparecchio alla rete elettrica e connettere al circuito una mascherina idonea (4)
- a 1-4-3-2
  - b 4-2-3-1
  - c 2-3-4-1

### 3. Il signor Bianchi di anni 68 viene ricoverato in area medica per febbre ricorrente. Bianchi già da diversi anni è in cura con farmaci psicotropi. L'Infermiere che prende in carico il Paziente deve valutare il rischio di caduta. Si forniscano le motivazioni e quali fattori devono essere analizzati

- a si deve analizzare il rischio di cadute perché Bianchi ha 68 anni ed è in cura con farmaci psicotropi. L'Infermiere esegue una valutazione dell'ambiente in cui viene accolto il Paziente e deve valutare fattori legati al Paziente stesso, quali, ad esempio, deficit della memoria, eventuale incontinenza urinaria, precedenti cadute, paura di cadere
- b si deve analizzare il rischio di cadute perché Bianchi ha 68 anni ed è in cura con farmaci psicotropi, su prescrizione medica ed è opportuno posizionare le sponde al letto per prevenire le eventuali cadute visto che il nuovo ambiente, in cui viene accolto il Paziente, potrebbe disorientarlo
- c si deve analizzare il rischio di cadute perché Bianchi ha 68 anni ed è in cura con farmaci psicotropi. L'Infermiere esegue una valutazione dei fattori legati al Paziente stesso, quali, ad esempio, deficit della memoria, eventuale incontinenza urinaria, precedenti cadute, paura di cadere

### 4. La scelta di un corretto presidio per la raccolta delle feci in caso di stomia dipende da

- a non vi è alcuna dipendenza
- b esigenze della persona, tipo di stomia, posizione sull'addome
- c dalla prescrizione fornita dal Medico e quanto disponibile in farmacia

### 5. Cosa indica l'affermazione anglosassone "Failure to Rescue"

- a le procedure di gestione degli eventi avversi
- b il successo nel trattare un paziente dopo un evento avverso
- c l'incapacità di salvare la vita di un paziente dopo un evento avverso



**6. A seguito dell'emanazione della L. 38/2010, la rilevazione del dolore**

- a è facoltativa
- b rappresenta una buona prassi ma non è un obbligo
- c **rappresenta un obbligo per il personale medico e infermieristico**

**7. Un Paziente anziano affetto da broncopneumopatia cronico ostruttiva viene ricoverato presso il servizio di Medicina per dispnea; il Medico prescrive la somministrazione di ossigeno al 40% per otto ore al giorno. Quale presidio utilizzerà l'Infermiere per somministrare la terapia**

- a cannula nasale
- b maschera facciale semplice
- c **maschera di Venturi**

**8. Il massaggio cardiaco nel bambino deve essere effettuato**

- a circondando con le mani il torace e premendo sullo sterno con i pollici
- b **posizionando una mano con il palmo appoggiato sul terzo inferiore dello sterno**
- c collocando una mano sul terzo superiore dello sterno

**9. In una Paziente ricoverata con diagnosi di gravidanza extrauterina l'assistenza è rivolta a**

- a prevenire le complicanze posizionando la donna in posizione di Trendelenburg
- b **rilevare tempestivamente i segni di shock ipovolemico**
- c mantenere una rigorosa dieta iposodica

**10. In un Paziente sottoposto a terapia infusionale venosa periferica si deve sospettare una tromboflebite se si nota**

- a **la presenza intorno alla sede di introduzione dell'ago di una tumefazione tesa, dolente e arrossata**
- b la presenza di soffi emorragici intorno alla sede di introduzione dell'ago
- c la presenza di eritema bolloso intorno alla sede di introduzione dall'ago