



**CONCORSO PUBBLICO, per titoli ed esami, congiunto tra Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Azienda USL di Imola, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Ferrara e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, per la copertura di n. 6 posti vacanti nel profilo professionale di
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
FISIOTERAPISTA – CAT. D**

PROVA SCRITTA A

TIPO TEST: 1

(contrassegnare nel foglio risposte con una crocetta il numero 1 del TIPO TEST)

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten initials



PROVA SCRITTA A – TIPO TEST 1

1. Quando un paziente non riesce a identificare quale dito della mano gli si sta toccando si parla di un disturbo della:

- A sensibilità tattile protopatica
- B sensibilità cinestesica
- C sensibilità tattile epicritica**
- D sensibilità propriocettiva

2. Quale fra le seguenti situazioni si osserva nel bambino tra i due e i quattro mesi di età ?

- A Il fenomeno della lallazione
- B L'esordio della masticazione
- C La deambulazione
- D Il riflesso tonico-asimmetrico del collo**

3. Quali tra i seguenti recettori non fanno parte dei propriocettori articolari?

- A Le terminazioni di Ruffini
- B I corpuscoli di Pacini
- C Gli organi tendinei del Golgi**
- D le terminazioni libere

4. Quale dei seguenti muscoli svolge azione di abduzione ed extrarotazione della scapola?

- A Gran dorsale
- B Gran dentato**
- C Romboide
- D Deltoide posteriore

5. In un passo, la fase di appoggio impegna percentualmente circa:

- A il 20% del ciclo
- B il 35% del ciclo
- C il 50% del ciclo
- D il 60% del ciclo**

6. Quale fra i seguenti gruppi muscolari è attivo per la maggior parte del tempo durante il cammino:


- A Il quadricipite femorale
- B I glutei
- C Gli adduttori
- D I flessori dorsali del piede**

7. Durante il cammino, il baricentro è:

- A più basso in fase oscillante
- B più alto in fase di doppio appoggio
- C più alto in fase oscillante**
- D ad altezza costante durante tutto il ciclo del cammino

8. Quali fasci nervosi trasportano la sensibilità tattile epicritica e propriocettiva cosciente?

- A Spino-cerebellare dorsale e ventrale
- B Spino-talamici ventrale e laterale
- C Lemnisco viscerale e spino-tettale
- D Fascicoli gracile e cuneato**



9. Quale delle seguenti funzioni è propria del paleocerebello?

- A Regolazione dell'equilibrio
- B Regolazione del tono posturale**
- C Controllo di movimenti volontari e automatici
- D tutte le alternative proposte sono corrette

10. Quale tra i seguenti non è un ramo terminale della carotide interna?

- A L'arteria cerebrale anteriore
- B L'arteria cerebrale media
- C L'arteria vertebrale**
- D L'arteria comunicante posteriore

11. Quale tra le seguenti turbe non è ascrivibile ad alterazioni del sistema neurovegetativo conseguenti a un trauma cranio-encefalico?

- A Turbe della sudorazione
- B Disturbi della deglutizione**
- C Algoneurodistrofia
- D Ipertensione arteriosa

12. Quale dei seguenti elementi riveste minor importanza nella valutazione degli esiti del grave traumatismo cranico?

- A L'esame articolare**
- B La coordinazione del paziente
- C I disturbi della sensibilità
- D I disturbi cognitivi

13. La sindrome di Wallenberg è espressione di una lesione localizzata a livello di:

- A cortico-sottocorticale
- B capsulare
- C del tronco encefalico
- D bulbare**

14. L'aprassia che comporta per il paziente difficoltà all'esecuzione di azioni su comando verbale o su imitazione è detta:

- A motoria
- B ideomotoria**
- C ideativa
- D costruttiva

15. In Pazienti con problemi di deglutizione, quale tipo di alimento dà luogo più facilmente ad una falsa deglutizione?

- A Alimenti liquidi**
- B Alimenti solidi
- C Alimenti semi solidi
- D La probabilità di falsa deglutizione non dipende dal tipo di alimento

16. Che cosa è L'International Classification of Functioning ?

- A La Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati e del funzionamento
- B La Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati
- C La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute**
- D La Classificazione Statistica ed Internazionale della Disabilità, della Salute e delle Malattia

17. Quale tra le seguenti patologie è frequentemente caratterizzata da una sindrome respiratoria di tipo restrittivo?

- A La spondilite anchilosante
- B L'artrite reumatoide
- C La malattia di Alzheimer
- D La paraplegia

18. Il riflesso bicipitale brachiale interessa principalmente le radici?

- A C4-C5
- B C5-C6**
- C C6-C7
- D C7-C8

19. Per posizionare seduto correttamente un bambino affetto da PCI che presenta un buon controllo del tronco, lo schienale deve avere un'inclinazione pari a:

- A 90°
- B 100°
- C 110°
- D 120°

20. Quale fra le seguenti posizioni è sconsigliata nella fase post-acuta dell'emiplegia?

- A Il decubito sul lato sano
- B Il decubito sul lato plegico
- C La posizione supina
- D La posizione semiseduta nel letto**

21. In uno studio osservazionale :


- A Il ricercatore interviene modificando la pratica clinica
- B Il ricercatore studia il decorso naturale dei fenomeni**
- C Il ricercatore valuta l'efficacia di un trattamento
- D Nessuna delle precedenti


22. La ricerca che studia e misura l'entità di un fenomeno attraverso studi osservazionali e sperimentali, viene definita:

- A Ricerca quantitativa**
- B Ricerca qualitativa
- C Entrambe le precedenti
- D Nessuna delle precedenti

23. Il muscolo trapezio è innervato:

- A dalle radici C2-C3
- B dal vago
- C dall'accessorio del vago
- D sia dalle radici C2-C3 che dall'accessorio del vago**





24. Le reazioni di raddrizzamento sono:

- A Schemi di movimento primitivi
- B Movimenti antigraavitari**
- C Movimenti automatici volti al recupero dell'equilibrio corporeo
- D Nessuna delle alternative proposte è corretta

25. Quali fra i seguenti elementi possono essere considerati segnali d'allarme patologico per un neonato:

- A La posizione da "schermidore" persistente**
- B La presenza del riflesso di Moro
- C Pianto notturno prolungato
- D La presenza del riflesso del *grasping*

26. Quando si interviene con la tecnica del bendaggio funzionale?

- A Già nelle prime 24/48 ore dopo la lesione muscolare**
- B Dopo una settimana dopo la lesione muscolare
- C Dopo due settimane dopo la lesione muscolare
- D Solo quando viene consentita una graduale ripresa delle attività funzionali

27. La misura ottimale per le porte di case per un paziente dotato di carrozzina è pari a circa:

- A 60-65 cm
- B 75-80 cm**
- C 90 cm
- D 100 cm

28. Quale fra le seguenti scale di misurazione è specifica per la valutazione del paziente in coma?

- A La scala FIM
- B Minimal State
- C La scala Glasgow**
- D La scala di Ashworth

29. Quando il paziente ignora il lato lesso, non lo riconosce o afferma che non gli appartiene, ci si trova di fronte ad un problema di:

- A Agnosia
- B Nosoagnosia
- C Emisomatoagnosia**
- D Prosopoagnosia

30. Quali sono nell'ordine, secondo le linee guida APTA - Guide to Physical Therapist Practice, 2001, le fasi della presa in carico fisioterapica ?

- A Diagnosi, Valutazione, Programmazione, intervento, Valutazione Finale
- B Valutazione iniziale, Programmazione, Intervento, Valutazione Finale
- C Valutazione iniziale, Diagnosi, Programmazione, Intervento, Valutazione Finale**
- D Intervento, Valutazione, Diagnosi, Programmazione



CONCORSO PUBBLICO, per titoli ed esami, congiunto tra Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Azienda USL di Imola, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Ferrara e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, per la copertura di n. 6 posti vacanti nel profilo professionale di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – FISIOTERAPISTA – CAT. D

PROVA SCRITTA A

TIPO TEST: 2

(contrassegnare nel foglio risposte con una crocetta il numero 2 del TIPO TEST)



PROVA SCRITTA A – TIPO TEST 2

1. Quali sono nell'ordine, secondo le linee guida APTA - Guide to Physical Therapist Practice, 2001, le fasi della presa in carico fisioterapica ?

- A Diagnosi, Valutazione, Programmazione, intervento, Valutazione Finale
- B Valutazione iniziale, Programmazione, Intervento, Valutazione Finale
- C Valutazione iniziale, Diagnosi, Programmazione, Intervento, Valutazione Finale**
- D Intervento, Valutazione, Diagnosi, Programmazione

2. Quando il paziente ignora il lato lesso, non lo riconosce o afferma che non gli appartiene, ci si trova di fronte ad un problema di:

- A Agnosia
- B Nosoagnosia
- C Emisomatoagnosia**
- D Prosopoagnosia

3. Quale fra le seguenti scale di misurazione è specifica per la valutazione del paziente in coma?

- A La scala FIM
- B Minimental State
- C La scala Glasgow**
- D La scala di Ashworth

4. La misura ottimale per le porte di case per un paziente dotato di carrozzina è pari a circa:

- A 60-65 cm
- B 75-80 cm**
- C 90 cm
- D 100 cm

5. Quando si interviene con la tecnica del bendaggio funzionale?

- A Già nelle prime 24/48 ore dopo la lesione muscolare**
- B Dopo una settimana dopo la lesione muscolare
- C Dopo due settimane dopo la lesione muscolare
- D Solo quando viene consentita una graduale ripresa delle attività funzionali

6. Quali fra i seguenti elementi possono essere considerati segnali d'allarme patologico per un neonato:

- A La posizione da "schermidore" persistente**
- B La presenza del riflesso di Moro
- C Pianto notturno prolungato
- D La presenza del riflesso del *grasping*

7. Le reazioni di raddrizzamento sono:

- A Schemi di movimento primitivi
- B Movimenti antigravitari**
- C Movimenti automatici volti al recupero dell'equilibrio corporeo
- D Nessuna delle alternative proposte è corretta





8. Il muscolo trapezio è innervato:

- A dalle radici C2-C3
- B dal vago
- C dall'accessorio del vago
- D sia dalle radici C2-C3 che dall'accessorio del vago**

9. La ricerca che studia e misura l'entità di un fenomeno attraverso studi osservazionali e sperimentali, viene definita:

- A Ricerca quantitativa**
- B Ricerca qualitativa
- C Entrambe le precedenti
- D Nessuna delle precedenti

10. In uno studio osservazionale :

- A Il ricercatore interviene modificando la pratica clinica
- B Il ricercatore studia il decorso naturale dei fenomeni**
- C Il ricercatore valuta l'efficacia di un trattamento
- D Nessuna delle precedenti

11. Quale fra le seguenti posizioni è sconsigliata nella fase post-acuta dell'emiplegia?

- A Il decubito sul lato sano
- B Il decubito sul lato plegico
- C La posizione supina
- D La posizione semiseduta nel letto**

12. Per posizionare seduto correttamente un bambino affetto da PCI che presenta un buon controllo del tronco, lo schienale deve avere un'inclinazione pari a:


- A 90°**
- B 100°
- C 110°
- D 120°

13. Il riflesso bicipitale brachiale interessa principalmente le radici?

- A C4-C5
- B C5-C6**
- C C6-C7
- D C7-C8

14. Quale tra le seguenti patologie è frequentemente caratterizzata da una sindrome respiratoria di tipo restrittivo?

- A La spondilite anchilosante**
- B L'artrite reumatoide
- C La malattia di Alzheimer
- D La paraplegia



15. Che cosa è L'International Classification of Functioning ?

- A La Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati e del funzionamento
- B La Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati
- C La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute**
- D La Classificazione Statistica ed Internazionale della Disabilità, della Salute e delle Malattia

16. In Pazienti con problemi di deglutizione, quale tipo di alimento dà luogo più facilmente ad una falsa deglutizione?

- A Alimenti liquidi**
- B Alimenti solidi
- C Alimenti semi solidi
- D La probabilità di falsa deglutizione non dipende dal tipo di alimento

17. L'aprassia che comporta per il paziente difficoltà all'esecuzione di azioni su comando verbale o su imitazione è detta:

- A motoria
- B ideomotora**
- C ideativa
- D costruttiva

18. La sindrome di Wallenberg è espressione di una lesione localizzata a livello di:

- A cortico-sottocorticale
- B capsulare
- C del tronco encefalico
- D bulbare**

19. Quale dei seguenti elementi riveste minor importanza nella valutazione degli esiti del grave traumatismo cranico?

- A L'esame articolare**
- B La coordinazione del paziente
- C I disturbi della sensibilità
- D I disturbi cognitivi

20. Quale tra le seguenti turbe non è ascrivibile ad alterazioni del sistema neurovegetativo conseguenti a un trauma cranio-encefalico?


- A Turbe della sudorazione
- B Disturbi della deglutizione**
- C Algoneurodistrofia
- D Iperensione arteriosa

21 Quale tra i seguenti non è un ramo terminale della carotide interna?

- A L'arteria cerebrale anteriore
- B L'arteria cerebrale media
- C L'arteria vertebrale**
- D L'arteria comunicante posteriore

22. Quale delle seguenti funzioni è propria del paleocerebello?

- A Regolazione dell'equilibrio
- B Regolazione del tono posturale**
- C Controllo di movimenti volontari e automatici
- D tutte le alternative proposte sono corrette



23. Quali fasci nervosi trasportano la sensibilità tattile epicritica e propriocettiva cosciente?

- A Spino-cerebellare dorsale e ventrale
- B Spino-talamici ventrale e laterale
- C Lemnisco viscerale e spino-tettale
- D Fascicoli gracile e cuneato**

24. Durante il cammino, il baricentro è:

- A più basso in fase oscillante
- B più alto in fase di doppio appoggio
- C più alto in fase oscillante**
- D ad altezza costante durante tutto il ciclo del cammino

25. Quale fra i seguenti gruppi muscolari è attivo per la maggior parte del tempo durante il cammino:

- A Il quadricipite femorale
- B I glutei
- C Gli adduttori
- D I flessori dorsali del piede**

26. In un passo, la fase di appoggio impegna percentualmente circa:

- A il 20% del ciclo
- B il 35% del ciclo
- C il 50% del ciclo
- D il 60% del ciclo**

27. Quale dei seguenti muscoli svolge azione di abduzione ed extrarotazione della scapola?

- A Gran dorsale
- B Gran dentato**
- C Romboide
- D Deltoide posteriore

28. Quali tra i seguenti recettori non fanno parte dei propriocettori articolari?

- A Le terminazioni di Ruffini
- B I corpuscoli di Pacini
- C Gli organi tendinei del Golgi**
- D le terminazioni libere

29. Quale fra le seguenti situazioni si osserva nel bambino tra i due e i quattro mesi di età ?

- A Il fenomeno della lallazione
- B L'esordio della masticazione
- C La deambulazione
- D Il riflesso tonico-asimmetrico del collo**

30. Quando un paziente non riesce a identificare quale dito della mano gli si sta toccando si parla di un disturbo della:

- A sensibilità tattile protopatica
- B sensibilità cinestesica
- C sensibilità tattile epicritica**
- D sensibilità propriocettiva



+

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola-Malpighi

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
ALMA MATER STUDIOSA
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
università di ferrara
UNIVERSITÀ DI FERRARA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara



CONCORSO PUBBLICO, per titoli ed esami, congiunto tra Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Azienda USL di Imola, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Ferrara e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, per la copertura di n. 6 posti vacanti nel profilo professionale di
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
FISIOTERAPISTA – CAT. D

PROVA SCRITTA A

TIPO TEST: 3

(contrassegnare nel foglio risposte con una crocetta il numero 3 del TIPO TEST)



1. Quale dei seguenti elementi riveste minor importanza nella valutazione degli esiti del grave traumatismo cranico?

A L'esame articolare

B La coordinazione del paziente

C I disturbi della sensibilità

D I disturbi cognitivi

2. Quali tra i seguenti recettori non fanno parte dei propriocettori articolari?

A Le terminazioni di Ruffini

B I corpuscoli di Pacini

C Gli organi tendinei del Golgi

D le terminazioni libere

3. La ricerca che studia e misura l'entità di un fenomeno attraverso studi osservazionali e sperimentali, viene definita:

A Ricerca quantitativa

B Ricerca qualitativa

C Entrambe le precedenti

D Nessuna delle precedenti

4. In un passo, la fase di appoggio impegna percentualmente circa:

A il 20% del ciclo

B il 35% del ciclo

C il 50% del ciclo

D il 60% del ciclo

5. Quali fra i seguenti elementi possono essere considerati segnali d'allarme patologico per un neonato:

A La posizione da "schermidore" persistente

B La presenza del riflesso di Moro

C Pianto notturno prolungato

D La presenza del riflesso del *grasping*

6. Quale fra i seguenti gruppi muscolari è attivo per la maggior parte del tempo durante il cammino:

A Il quadricipite femorale

B I glutei

C Gli adduttori

D I flessori dorsali del piede


7. Quando un paziente non riesce a identificare quale dito della mano gli si sta toccando si parla di un disturbo della:


A sensibilità tattile protopatica

B sensibilità cinestesica

C sensibilità tattile epicritica

D sensibilità propriocettiva





8. Durante il cammino, il baricentro è:

- A più basso in fase oscillante
- B più alto in fase di doppio appoggio
- C più alto in fase oscillante**
- D ad altezza costante durante tutto il ciclo del cammino

9. Quando il paziente ignora il lato lesso, non lo riconosce o afferma che non gli appartiene, ci si trova di fronte ad un problema di:

- A Agnosia
- B Nosoagnosia
- C Emisomatoagnosia**
- D Prosopoagnosia

10. Quali fasci nervosi trasportano la sensibilità tattile epicritica e propriocettiva cosciente?

- A Spino-cerebellare dorsale e ventrale
- B Spino-talamici ventrale e laterale
- C Lemnisco viscerale e spino-tettale
- D Fascicoli gracile e cuneato**

11. Quale fra le seguenti situazioni si osserva nel bambino tra i due e i quattro mesi di età ?

- A Il fenomeno della lallazione
- B L'esordio della masticazione
- C La deambulazione
- D Il riflesso tonico-asimmetrico del collo**

12. Quali sono nell'ordine, secondo le linee guida APTA - Guide to Physical Therapist Practice, 2001, le fasi della presa in carico fisioterapica ?

- A Diagnosi, Valutazione, Programmazione, intervento, Valutazione Finale
- B Valutazione iniziale, Programmazione, Intervento, Valutazione Finale
- C Valutazione iniziale, Diagnosi, Programmazione, Intervento, Valutazione Finale**
- D Intervento, Valutazione, Diagnosi, Programmazione

13. Quale dei seguenti muscoli svolge azione di abduzione ed extrarotazione della scapola?


- A Gran dorsale
- B Gran dentato**
- C Romboide
- D Deltoido posteriore

14. Quale delle seguenti funzioni è propria del paleocerebello?

- A Regolazione dell'equilibrio
- B Regolazione del tono posturale**
- C Controllo di movimenti volontari e automatici
- D tutte le alternative proposte sono corrette

15. Quale tra le seguenti turbe non è ascrivibile ad alterazioni del sistema neurovegetativo conseguenti a un trauma cranio-encefalico?

- A Turbe della sudorazione
- B Disturbi della deglutizione**
- C Algoneurodistrofia
- D Iperensione arteriosa



16. La sindrome di Wallenberg è espressione di una lesione localizzata a livello di:

- A cortico-sottocorticale
- B capsulare
- C del tronco encefalico
- D bulbare**

17. L'aprassia che comporta per il paziente difficoltà all'esecuzione di azioni su comando verbale o su imitazione è detta:

- A motoria
- B ideomotoria**
- C ideativa
- D costruttiva

18 Quale tra i seguenti non è un ramo terminale della carotide interna?

- A L'arteria cerebrale anteriore
- B L'arteria cerebrale media
- C L'arteria vertebrale**
- D L'arteria comunicante posteriore

19. In Pazienti con problemi di deglutizione, quale tipo di alimento dà luogo più facilmente ad una falsa deglutizione?

- A Alimenti liquidi**
- B Alimenti solidi
- C Alimenti semi solidi
- D La probabilità di falsa deglutizione non dipende dal tipo di alimento

20. Che cosa è L'International Classification of Functioning ?

- A La Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati e del funzionamento
- B La Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati
- C La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute**
- D La Classificazione Statistica ed Internazionale della Disabilità, della Salute e delle Malattia

21. La misura ottimale per le porte di case per un paziente dotato di carrozzina è pari a circa:

- A 60-65 cm
- B 75-80 cm**
- C 90 cm
- D 100 cm

22. Il riflesso bicipitale brachiale interessa principalmente le radici?

- A C4-C5
- B C5-C6**
- C C6-C7
- D C7-C8

23. Per posizionare seduto correttamente un bambino affetto da PCI che presenta un buon controllo del tronco, lo schienale deve avere un'inclinazione pari a:

- A 90°
- B 100°
- C 110°
- D 120°



24. Quale tra le seguenti patologie è frequentemente caratterizzata da una sindrome respiratoria di tipo restrittivo?

- A La spondilite anchilosante
- B L'artrite reumatoide
- C La malattia di Alzheimer
- D La paraplegia

25. Quale fra le seguenti posizioni è sconsigliata nella fase post-acuta dell'emiplegia?

- A Il decubito sul lato sano
- B Il decubito sul lato plegico
- C La posizione supina
- D La posizione semiseduta nel letto

26. In uno studio osservazionale :

- A Il ricercatore interviene modificando la pratica clinica
- B Il ricercatore studia il decorso naturale dei fenomeni
- C Il ricercatore valuta l'efficacia di un trattamento
- D Nessuna delle precedenti

27. Il muscolo trapezio è innervato:

- A dalle radici C2-C3
- B dal vago
- C dall'accessorio del vago
- D sia dalle radici C2-C3 che dall'accessorio del vago

28. Le reazioni di raddrizzamento sono:

- A Schemi di movimento primitivi
- B Movimenti antigravitari
- C Movimenti automatici volti al recupero dell'equilibrio corporeo
- D Nessuna delle alternative proposte è corretta

29. Quando si interviene con la tecnica del bendaggio funzionale?

- A Già nelle prime 24/48 ore dopo la lesione muscolare
- B Dopo una settimana dopo la lesione muscolare
- C Dop due settimane dopo la lesione muscolare
- D Solo quando viene consentita una graduale ripresa delle attività funzionali



30. Quale fra le seguenti scale di misurazione è specifica per la valutazione del paziente in coma?

- A La scala FIM
- B Minimental State
- C La scala Glasgow
- D La scala di Ashworth

