

**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA
DI 3 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI**

OSTETRICA – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

**PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, DELL'IRCCS AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA E
DELL'AZIENDA USL DI IMOLA**

29/02/2024

PROVA SCRITTA C

CR Su RLB

1. Quale muscolo non fa parte del diaframma pelvico?
 - a. Muscolo elevatore dell'ano
 - b. Muscolo ischio-coccigeo
 - c. **Muscolo bulbo cavernoso**

2. Secondo quanto riportato dal Ministero della Salute, quali di questi è un virus HPV ad "alto rischio" oncogeno?
 - a. 6
 - b. 11
 - c. **18**

3. Quale delle seguenti domande non è fa parte dello screening di Whooley"?
 - a. Durante l'ultimo mese si è sentita spesso giù di morale, depressa o senza speranze?
 - b. Durante l'ultimo mese ha provato spesso poco interesse o piacere nel fare le cose?
 - c. **Durante l'ultimo mese piange spesso in modo inconsolabile?**

4. Nel ciclo mestruale, partendo dal primo giorno di mestruazione, si distinguono tre fasi. Indicare quale tra le seguenti alternative le riporta in ordine corretto:
 - a. **Follicolare , ovulatoria, luteale**
 - b. Ovulatoria, follicolare, luteale
 - c. Luteale, ovulatoria, follicolare

5. La menopausa conclamata si caratterizza per un preciso quadro endocrino. Selezionare quale di questi valori non corrisponde al quadro endocrino della menopausa.
 - a. Elevati livelli di FSH e LH
 - b. **Alti livelli di estradiolo**
 - c. Totale assenza di progesterone

6. Si parla di amenorrea primaria quando:
 - a. **Quando il primo ciclo mestruale (menarca) non si presenta entro i 15 anni o entro cinque anni dalla comparsa dei caratteri secondari**
 - b. Quando il ciclo mestruale, prima presente in modo più o meno regolare, si interrompe
 - c. Perdita ematica abbondante

7. Qual è il numero da chiamare in caso di richiesta di aiuto e sostegno per le donne che subiscono violenza?
 - a. 1520
 - b. **1522**
 - c. 1530

ER SR MR JB

8. Se l'infezione da Neisseria Gonorrhoeae non viene trattata in quale malattia può evolvere?
 - a. **Malattia infiammatoria pelvica (PID)**
 - b. Tumore alla cervice
 - c. Tumore all'ovaio

9. Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, In quale dei seguenti casi l'allattamento materno non è controindicato?
 - a. **Donna con infezione da HPV**
 - b. Donna con infezione da Herpes simplex a livello del capezzolo
 - c. Donna con infezione da HIV

10. Lo screening sierologico dell'Epatite C , secondo la nuova Linea Guida Istituto Superiore di Sanità Gravidanza Fisiologica Parte I del 2023, non deve essere offerto alle donne in gravidanza
 - a. **FALSO, deve essere offerto a tutte le donne nel terzo trimestre di gravidanza, indipendentemente dai fattori di rischio**
 - b. FALSO , deve essere offerto solo alle donne nel terzo trimestre di gravidanza che presentino fattori di rischio
 - c. FALSO, deve essere offerto a tutte le donne esclusivamente nel primo trimestre di gravidanza, indipendentemente dai fattori di rischio

11. Secondo la nuova Linea Guida Istituto Superiore di Sanità Gravidanza Fisiologica Parte I del 2023, lo screening dell'infezione da HIV dovrebbe essere offerto a tutte le donne in gravidanza esclusivamente alla prima visita prenatale
 - a. VERO, lo screening dell'infezione da HIV deve essere offerto a tutte le donne in gravidanza esclusivamente alla prima visita prenatale
 - b. FALSO, lo screening dell'infezione da HIV deve essere offerto a tutte le donne in gravidanza alla prima visita prenatale e nel terzo trimestre di gravidanza
 - c. **FALSO, lo screening dell'infezione da HIV deve essere offerto a tutte le donne in gravidanza alla prima visita prenatale e, in presenza di fattori di rischio, anche nel terzo trimestre di gravidanza**

12. La classe II di Robson è definita da:
 - a. Nullipare, gravidanza singola, presentazione cefalica, \geq a 37 settimane di gestazione, in travaglio spontaneo
 - b. Multipare, senza precedente cicatrice uterina, gravidanza singola, presentazione cefalica, \geq a 37 settimane di gestazione, in travaglio spontaneo
 - c. **Nullipare, gravidanza singola, presentazione cefalica, \geq a 37 settimane di gestazione, travaglio indotto o sottoposte a taglio cesareo in assenza di travaglio**

CR SJ PI GB

13. Quali fra questi sono fattori di rischio per raccomandare a una donna in gravidanza lo screening per il diabete gestazionale a 24-28 settimane, secondo la Linea Guida Istituto Superiore di Sanità Gravidanza Fisiologica aggiornamento 2011
- Nulliparità e riscontro di valore di glicemia plasmatica all'inizio della gravidanza di 90 mg/dl
 - Età \geq 35 anni , precedente gravidanza con macrosomia fetale (peso \geq 4,5 Kg), precedente gravidanza con diabete gestazionale e OGTT fra 16-18 settimane nella norma, indice di massa corporea (IMC) \geq 25 Kg/m₂**
 - Multiparità, precedente Taglio Cesareo o Precedente parto complicato da distocia di spalla
14. Secondo le raccomandazioni SIGO- AOGOI di gennaio 2021, cosa occorre fare prima dell'applicazione della ventosa ostetrica?
- Valutare le indicazioni al parto operativo vaginale, valutare l'assenza di controindicazioni, è necessario che la vescica sia vuota ed occorre effettuare la visita ostetrica. Gli operatori devono informare la paziente in merito alla procedura e devono ottenere il consenso che può essere in forma verbale.**
 - Valutare le indicazioni e l'assenza di controindicazioni al parto vaginale operativo con ventosa ostetrica, è necessario che la vescica sia vuota ed occorre effettuare la visita ostetrica. Gli operatori devono informare la paziente in merito alla procedura e devono ottenere il consenso che deve essere in forma scritta.
 - Nessuna delle precedenti
15. Secondo le raccomandazioni SIGO- AOGOI di gennaio 2021, in caso di parto operativo vaginale (POV) mediante ventosa ostetrica quali delle seguenti affermazioni è vera?
- Non si dovrebbero effettuare manovre di Kristeller se non eccezionalmente a testa incoronata per facilitare la deflessione della testa ed accorciare i tempi del periodo espulsivo, l'episiotomia di routine non è raccomandata, non è indicato l'uso routinario di ossitocina.**
 - Prima dell'applicazione della ventosa ostetrica e sempre opportuno l'uso di ossitocina per garantire contrazioni uterine valide, non si dovrebbero effettuare manovre di Kristeller, l'episiotomia di routine non è raccomandata.
 - Prima dell'applicazione della ventosa ostetrica è sempre opportuno, quando la testa arriva al piano perineale effettuare l'episiotomia, non ci sono grosse evidenze sull'uso routinario dell'antibiotico
16. In base all'indice di APGAR a 1 minuto un punteggio da 0 a 3 è necessario:
- Osservare il neonato e attendere seconda valutazione a 5 minuti
 - Ricorrere alla ventilazione, alla rianimazione cardio-circolatoria**
 - Stimolare energicamente il neonato

17. Secondo le raccomandazioni SIGO -AOGOI di buona pratica clinica sull'assistenza al parto nelle donne precesarizzate di dicembre 2021, quando è bene programmare ed eseguire un taglio cesareo iterativo programmato?
- In caso di precedente incisione longitudinale o a T rovesciata sull'utero, precedente rottura d'utero, controindicazioni al parto vaginale, scelta della donna di non affrontare il travaglio di parto. La programmazione del taglio cesareo ripetuto va effettuata a partire dalla 39° settimane di gravidanza, con indicazioni ad anticiparla in caso di pregressa rottura d'utero.**
 - In caso di precedente incisione longitudinale o a T rovesciata sull'utero, precedente rottura d'utero, controindicazioni al parto vaginale. La programmazione del taglio cesareo ripetuto va effettuata a partire dalla 37° settimane di gravidanza, con indicazioni ad anticiparla in caso di pregressa rottura d'utero. Feto macrosoma.
 - In caso di precedente incisione longitudinale o a T rovesciata sull'utero, precedente rottura d'utero, pregressa miomectomia, controindicazioni al parto. La programmazione del taglio cesareo ripetuto va effettuata a partire dalla 38° settimane di gravidanza, con indicazioni ad anticiparla in caso di pregressa rottura d'utero. Donne con BMI compreso tra 30 e 40 Kg/mq.
18. Secondo le raccomandazioni AOGOI- SIGO sulla gestione della distocia delle spalle di Gennaio 2024, cosa s'intende per postura di Walcher?
- Si ottiene chiedendo alla donna dalla postura litotomica di abbassare le cosce e le gambe in modo che i piedi pendano verso il basso senza toccare il pavimento, con natiche a bordo letto e tronco disteso.**
 - Si ottiene facendo flettere le gambe sulle cosce e quest'ultime sull'addome con tronco totalmente disteso.
 - Si ottiene chiedendo alla donna di mettersi sulle ginocchia e di portare in avanti il tronco sostenendosi sulle mani.
19. Quale affermazione è vera?
- DPR del 5 aprile 1950, n. 221 *"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo 233/1946 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse"*
 - D.M. 14 settembre 1994, n. 740 *"Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ostetrica/o"*
 - Tutte le precedenti**
20. Quali sono le raccomandazioni dell'OMS per la prevenzione e trattamento delle infezioni materne riportate nelle Linee Guida Istituto Superiore di Sanità "La sepsi in Ostetricia" 2018
- Esplorazioni vaginali ogni 4 ore per la valutazione del travaglio nel I stadio per le donne che rientrano nel percorso di fisiologia**
 - Somministrazione di antibiotico terapia di routine in caso di travaglio pretermine con membrane amniocoriali integre
 - Somministrazione di antibiotico terapia di routine in caso di accertamento di rottura prematura delle membrane amniocoriali entro un'ora