




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliera - Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola-Malpighi




**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI, A N. 2 POSTI DI
DIRIGENTE FARMACISTA DELLA DISCIPLINA DI
FARMACIA OSPEDALIERA**

PROVA PRATICA N. 3

CORRETTA DISPENSAZIONE DEL FARMACO TICAGRELOR 60MG: individuare eventuali elementi di criticità e/o inappropriata prescrizione presenti sul documento allegato 3, alla luce del quadro normativo vigente

Prava non sono corretta 12/05/2021

[Handwritten signature]



Codice HSP e struttura medico prescrittore
Centro abilitato
Nome e cognome del medico prescrittore
Telefono del medico prescrittore
Mail del medico prescrittore

08001101
 UO Medicina Interna
 Anna Bianchi
 051 6478111
 a.bianchi@ausl.bologna.it

Nome e cognome del paziente MARIO ROSSI
Data di Nascita 01/01/1950
Indirizzo residenza via S'Isaia n. 40, Bologna
Ausl di residenza Bologna
Ausl di assistenza Bologna

Sesso M
Codice Fiscale RSS MRA 50
Telefono 051 6478112
Regione residenza Emilia Romagna
Medico di Famiglia Neri Andrea

La scelta di prolungare la DAPT oltre il 12° mese deve essere il frutto di un attento bilancio fra il rischio ischemico residuo e una profonda analisi del rischio emorragico (vidi tab.1 del "Documento di indirizzo. Terapia antitrombotica nelle Sindromi Coronariche Acute (SCA)" a cura del Gruppo di lavoro multidisciplinare della Regione Emilia-Romagna).

In particolare, il Piano terapeutico AIFA prevede che siano esclusi dal trattamento i pazienti ad elevato rischio emorragico che presentano almeno una delle seguenti condizioni: dialisi emorragica o disturbi noti della coagulazione; anamnesi di emorragia intracranica o emorragia gastrointestinale; terapia dialitica; insufficienza epatica; pregressa diagnosi di anomalia vascolare intracranica; tumore del SNC; ictus ischemico; intervento di neurochirurgia encefalica o spinale nel precedenti 5 anni; intervento di chirurgia maggiore negli ultimi 30 giorni; concomitante terapia anticoagulante.

prima prescrizione

prosecuzione terapia

Caratteristiche dei pazienti (criteri di elezione)

- età \geq 65 anni
 diabete mellito in terapia farmacologica
 insufficienza renale cronica non in dialisi (VFG $<$ 60 ml/min/1,73 m³)
 malattia coronarica multivasale (stenosi \geq 50% in almeno due distretti coronarici)
 ulteriore IMA antecedente all'evento indice

Condizioni espressamente richieste

- aderenza alla precedente DAPT
 assenza di complicanze emorragiche in corso di DAPT
 nessun intervento chirurgico programmato nei mesi successivi

Duplicata terapia antiaggregante (DAPT), ultimo farmaco utilizzato in associazione con ASA:

- Prasugrel 10 mg o 5 mg al giorno Ticagrelor 90 mg x 2
 Clopidogrel 75 mg al giorno

Data ultima assunzione: 30/03/2020

Farmaco Prescritto (principio attivo)

B01AC24 - TICAGRELOR

Dosaggio

60 MG

Forma

COMPRESSE

Posologia

60MG X 1 VOLTA AL GIORNO

Durata del trattamento prevista fino al (Data di scadenza)

09/05/2022

Firma del medico proscrittore
 Dr.ssa Anna Bianchi

PROVA NON
 SOSTECUATA
 20/05/2021
