



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

23/09/2020

PROVA PRATICA A

TIPO TEST 1

Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature at the top right.
Below it, the initials "AB" and "MB" are written.

- 1 La Scala di Conley è uno strumento utilizzato per:**
 - a la predizione del rischio di caduta
 - b la predizione del rischio di lesioni da decubito
 - c la valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiana

- 2 Il lavaggio sociale delle mani si effettua:**
 - a con acqua e sapone detergente per una durata di 40 – 60 secondi
 - b con antisettico per una durata di circa 2 minuti
 - c frizionando le mani con soluzione alcolica per una durata di circa 10 minuti

- 3 Per aiutare un soggetto ad espettorare le secrezioni è utile:**
 - a invitarlo a tossire mantenendo il capo flesso verso il basso
 - b fargli assumere la posizione laterale e invitarlo a tossire con decisione
 - c associare la posizione seduta a respiri profondi e colpi di tosse

- 4 Quale ausilio è possibile utilizzare per facilitare il trasferimento laterale dal letto alla barella di un paziente con arti inferiori plegici:**
 - a la cintura ergonomica
 - b lo stabilizzatore per la postura corretta
 - c il telo ad alto scorrimento

- 5 L'attività di somministrazione di farmaci viene svolta dall'infermiere:**
 - a indipendentemente dalla prescrizione
 - b delegandola al personale di supporto
 - c garantendo la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche

- 6 Un paziente presenta picco febbrile. Il medico prescrive l'esecuzione di emocoltura. Quale tipologia di flaconi deve utilizzare l'infermiere:**
 - a flacone contenente anticoagulante
 - b flacone contenente terreno di coltura
 - c flacone contenente acido citrico

- 7 In caso di liberazione inefficace delle vie aeree correlata a aumentata produzione di muco e secrezioni dense, è necessario:**
 - a far assumere un litro di acqua al giorno al paziente
 - b insegnare esercizi di respirazione profonda e tosse efficace
 - c somministrare per via endovenosa farmaci antibiotici ad ampio spettro

- 8 Al termine di un'iniezione, l'infermiere deve smaltire la siringa e l'ago:**
 - a solo dopo aver incappucciato l'ago
 - b negli appositi contenitori, senza rimettere il cappuccio protettivo sull'ago
 - c nel più vicino cestino per i rifiuti

- 9 Il polso popliteo è reperibile:**
 - a nella parte posteriore del ginocchio
 - b a livello del malleolo
 - c a livello della piega del gomito



- 10 La posizione laterale di sicurezza del paziente è indicata in caso di:
- a infarto miocardico acuto
 - b frattura della colonna vertebrale
 - c perdita di coscienza

Handwritten signatures and initials: a large signature, the letters 'AB', and another signature.



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.

23/09/2020

PROVA PRATICA A

TIPO TEST 2

[Handwritten signatures]



- 1 Per aiutare un soggetto ad espettorare le secrezioni è utile:**
 - a invitarlo a tossire mantenendo il capo flesso verso il basso
 - b fargli assumere la posizione laterale e invitarlo a tossire con decisione
 - c associare la posizione seduta a respiri profondi e colpi di tosse

- 2 La Scala di Conley è uno strumento utilizzato per:**
 - a la predizione del rischio di caduta
 - b la predizione del rischio di lesioni da decubito
 - c la valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiana

- 3 Quale ausilio è possibile utilizzare per facilitare il trasferimento laterale dal letto alla barella di un paziente con arti inferiori plegici:**
 - a la cintura ergonomica
 - b lo stabilizzatore per la postura corretta
 - c il telo ad alto scorrimento

- 4 Il lavaggio sociale delle mani si effettua:**
 - a con acqua e sapone detergente per una durata di 40 – 60 secondi
 - b con antisettico per una durata di circa 2 minuti
 - c frizionando le mani con soluzione alcolica per una durata di circa 10 minuti

- 5 Un paziente presenta picco febbrile. Il medico prescrive l'esecuzione di emocoltura. Quale tipologia di flaconi deve utilizzare l'infermiere:**
 - a flacone contenente anticoagulante
 - b flacone contenente terreno di coltura
 - c flacone contenente acido citrico

- 6 La posizione laterale di sicurezza del paziente è indicata in caso di:**
 - a infarto miocardico acuto
 - b frattura della colonna vertebrale
 - c perdita di coscienza

- 7 In caso di liberazione inefficace delle vie aeree correlata a aumentata produzione di muco e secrezioni dense, è necessario:**
 - a far assumere un litro di acqua al giorno al paziente
 - b insegnare esercizi di respirazione profonda e tosse efficace
 - c somministrare per via endovenosa farmaci antibiotici ad ampio spettro

- 8 L'attività di somministrazione di farmaci viene svolta dall'infermiere:**
 - a indipendentemente dalla prescrizione
 - b delegandola al personale di supporto
 - c garantendo la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche

- 9 Al termine di un'iniezione, l'infermiere deve smaltire la siringa e l'ago:**
 - a solo dopo aver incappucciato l'ago
 - b negli appositi contenitori, senza rimettere il cappuccio protettivo sull'ago
 - c nel più vicino cestino per i rifiuti



10 Il polso popliteo è reperibile:

- a **nella parte posteriore del ginocchio**
- b a livello del malleolo
- c a livello della piega del gomito

h
AB mg



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI **COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.**

23/09/2020

PROVA PRATICA A

TIPO TEST 3

- 1 Un paziente presenta picco febbrile. Il medico prescrive l'esecuzione di emocoltura. Quale tipologia di flaconi deve utilizzare l'infermiere:**
 - a flacone contenente anticoagulante
 - b flacone contenente terreno di coltura**
 - c flacone contenente acido citrico

- 2 Il lavaggio sociale delle mani si effettua:**
 - a con acqua e sapone detergente per una durata di 40 – 60 secondi**
 - b con antisettico per una durata di circa 2 minuti
 - c frizionando le mani con soluzione alcolica per una durata di circa 10 minuti

- 3 Quale ausilio è possibile utilizzare per facilitare il trasferimento laterale dal letto alla barella di un paziente con arti inferiori plegici:**
 - a la cintura ergonomica
 - b lo stabilizzatore per la postura corretta
 - c il telo ad alto scorrimento**

- 4 L'attività di somministrazione di farmaci viene svolta dall'infermiere:**
 - a indipendentemente dalla prescrizione
 - b delegandola al personale di supporto
 - c garantendo la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche**

- 5 In caso di liberazione inefficace delle vie aeree correlata a aumentata produzione di muco e secrezioni dense, è necessario:**
 - a far assumere un litro di acqua al giorno al paziente
 - b insegnare esercizi di respirazione profonda e tosse efficace**
 - c somministrare per via endovenosa farmaci antibiotici ad ampio spettro

- 6 Per aiutare un soggetto ad espettorare le secrezioni è utile:**
 - a invitarlo a tossire mantenendo il capo flesso verso il basso
 - b fargli assumere la posizione laterale e invitarlo a tossire con decisione
 - c associare la posizione seduta a respiri profondi e colpi di tosse**

- 7 Al termine di un'iniezione, l'infermiere deve smaltire la siringa e l'ago:**
 - a solo dopo aver incappucciato l'ago
 - b negli appositi contenitori, senza rimettere il cappuccio protettivo sull'ago**
 - c nel più vicino cestino per i rifiuti

- 8 La posizione laterale di sicurezza del paziente è indicata in caso di:**
 - a infarto miocardico acuto
 - b frattura della colonna vertebrale
 - c perdita di coscienza**

- 9 Il polso popliteo è reperibile:**
 - a nella parte posteriore del ginocchio**
 - b a livello del malleolo
 - c a livello della piega del gomito



10 La Scala di Conley è uno strumento utilizzato per:

- a la predizione del rischio di caduta
- b la predizione del rischio di lesioni da decubito
- c la valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiana

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large 'N' and several illegible signatures.