

Anno 2021 e precedenti: tabelle dei dati

Tab. 1	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche persone incluse. Periodo 2010-2021
Tab. 2	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2010-2021
Tab. 3	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche persone non native. Periodo 2010-2021
Tab. 4	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" contatti di persone non native. Periodo 2010-2021
Tab. 5	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche persone minorenni. Periodo 2010-2021
Tab. 6	Consumo problematico di oppioidi. Caratteristiche persone. Periodo 2010-2021
Tab. 7	Consumo problematico di oppioidi. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2010-2021
Tab. 8	Consumo problematico di cocaina. Caratteristiche persone. Periodo 2010-2021
Tab. 9	Consumo problematico di cocaina. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2010-2021
Tab. 10	Consumo problematico di cannabinoidi. Caratteristiche persone. Periodo 2010-2021
Tab. 11	Consumo problematico di cannabinoidi. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2010-2021
Tab. 12	Consumo problematico di benzodiazepine. Caratteristiche persone. Periodo 2010-2021
Tab. 13	Consumo problematico di benzodiazepine. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2010-2021
Tab. 14	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche utenti in carico al SERT. Periodo 2010-2021
Tab. 15	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" utenti in carico al SERT. Periodo 2010-2021
Tab. 16	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche persone dimesse dagli Ospedali. Periodo 2010-2021
Tab. 17	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" persone dimesse dagli Ospedali. Periodo 2010-2021
Tab. 18	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche persone incluse. Periodo 2010-2021
Tab. 19	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2010-2021
Tab. 20	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche persone non native. Periodo 2010-2021
Tab. 21	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti di persone non native. Periodo 2010-2021
Tab. 22	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche persone minorenni. Periodo 2010-2021
Tab. 23	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche utenti in carico al SERT. Periodo 2010-2021
Tab. 24	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" utenti in carico al SERT. Periodo 2010-2021
Tab. 25	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche persone dimessi dagli Ospedali. Periodo 2010-2021
Tab. 26	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti di persone dimessi dagli Ospedali. Periodo 2010-2021
Tab. 27	Gioco problematico. Caratteristiche persone in carico al SERT. Periodo 2010-2021
Tab. 28	Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Prevalenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni per sesso e nazionalità. Periodo 2010-2021
Tab. 29	Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Incidenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni per sesso e nazionalità. Periodo 2010-2021
Tab. 30	Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Prevalenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2021.
Tab. 31	Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Incidenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2021.
Tab. 32	Consumo problematico sostanze psicoattive. Stima del sommerso. Periodo 2010-2021
Tab. 33	Sequestri di stupefacenti e operazioni antidroga da parte delle Forze dell'Ordine nella provincia di Bologna. Periodo 2010-2021
Tab. 34	Accessi ai reparti di Pronto Soccorso dovuti all'uso di sostanze psicoattive, Area metropolitana di Bologna. Periodo 2010-2021
Tab. 35	Accessi ai reparti di Pronto Soccorso per problemi alcol correlati, Area metropolitana di Bologna. Periodo 2010-2021
Tab. 36	Allerta rapida droghe Bologna. Decessi per overdose e accessi al pronto soccorso per overdose: caratteristiche delle persone e rapporto con i servizi. Periodo 2012-2021
Tab. 37	Allerta rapida droghe Bologna. Accessi al pronto soccorso per intossicazione alcolica acuta: caratteristiche all'arrivo al Pronto Soccorso. Periodo 2010-2021

Tab. 1 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche persone incluse. Periodo 2010-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	3330	3365	3628	3414	3343	3526	3544	3696	3781	3791	3845	3898
% nuovi contatti**	18.9	18.1	23.8	22.9	21.7	23.3	21.2	25.9	27.1	23.8	24.7	26.7
età media	41.9	42.0	41.2	41.1	40.6	40.4	39.8	40.1	39.7	38.8	38.9	37.7
% maschi	80.1	80.7	79.3	79.9	80.2	79.2	80.4	79.0	78.3	79.6	79.2	78.7
% femmine	19.9	19.3	20.7	20.1	19.8	20.8	19.6	21.0	21.7	20.4	20.8	21.3
% nativi	77.0	78.1	78.0	77.7	78.2	77.6	77.4	77.7	78.8	79.1	80.2	80.4
% non nativi	22.8	21.7	21.8	22.1	21.4	22.1	22.5	22.1	21.0	20.9	19.8	19.6
% residenti area metropolitana	78.4	77.9	79.4	76.9	78.2	73.5	75.1	74.6	73.1	71.1	72.0	70.3
% residenti fuori area metropolitana	19.0	19.2	18.2	21.0	18.6	24.2	23.4	23.6	25.2	27.8	27.9	27.8
% senza fissa dimora (SFD)	6.5	6.6	4.8	5.5	5.6	5.0	4.9	5.3	4.5	3.7	3.4	5.7
% decesso overdose	0.2	0.3	0.6	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.1
% oppioidi	58.6	60.6	58.2	61.3	64.0	64.7	68.2	70.3	66.0	75.9	78.5	73.7
di cui % oppioidi e cocaina	20.9	20.9	17.4	18.3	17.6	14.1	14.6	13.4	11.0	18.8	16.9	12.3
di cui % oppioidi e alcol (no cocaina)	4.5	4.7	4.2	4.7	4.4	4.6	5.3	5.9	5.0	10.6	11.3	12.9
di cui % solo oppioidi (no cocaina e no alcol)	33.2	35.0	36.5	38.4	41.9	46.0	48.4	51.0	50.0	46.5	50.3	48.5
% cocaina	46.7	44.7	41.0	40.1	38.6	31.8	30.8	27.9	24.7	29.4	26.6	24.5
di cui % cocaina e oppioidi	20.9	20.9	17.4	18.3	17.6	14.1	14.6	13.4	11.0	18.8	16.9	12.3
di cui % cocaina e alcol (no oppioidi)	8.7	7.5	6.9	5.3	5.3	4.7	4.5	3.9	3.4	2.9	2.3	3.9
di cui % solo cocaina (no oppioidi e no alcol)	17.2	16.3	16.7	16.5	15.6	12.9	11.7	10.6	10.3	7.7	7.4	8.3
% cannabinoidi	17.6	16.8	16.9	17.3	17.1	16.5	14.4	14.4	14.0	15.1	12.3	10.3
di cui % cannabis e alcol	2.9	2.4	2.0	2.3	2.2	1.9	1.9	1.8	1.6	1.8	1.1	1.4
di cui % cannabis e oppioidi-coca	0.3	0.4	0.3	0.6	0.4	0.4	0.5	0.2	0.3	1.9	1.1	0.5
di cui % cannabis e coca	5.2	4.8	5.1	5.0	5.0	4.4	3.3	2.9	2.2	2.0	1.2	1.2
di cui % cannabis e oppioidi	3.7	4.0	3.7	4.0	4.5	5.6	4.3	5.0	5.0	6.1	5.9	4.7
di cui % solo cannabis (no opp no coca no alc)	5.5	5.2	5.8	5.4	5.0	4.3	4.5	4.6	4.9	3.4	2.9	2.6
% altre sostanze illegali	10.4	11.9	12.1	12.2	12.3	12.8	11.8	14.0	10.2	14.7	12.4	11.6
di cui % allucinogeni	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.6	0.7	0.2
di cui % amfetamine	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.9	0.9	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5
di cui % crack	1.3	1.0	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.9	0.9	0.3
di cui % ecstasy	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3
di cui % GHB	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % ketamina	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
di cui % altra non indicata	8.6	10.1	10.7	11.0	11.0	12.7	6.5	13.1	6.0	6.6	10.8	9.1
% abuso concomitante di psicofarmaci	3.2	3.3	6.2	5.4	4.2	7.0	5.5	6.4	10.1	5.4	5.8	7.8
di cui % benzodiazepine	2.3	2.4	4.6	3.7	2.7	4.3	3.4	4.0	3.4	4.0	3.1	3.0
di cui % antidepressivi	0.1	0.1	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.9	1.3	1.0	1.8
di cui % barbiturici	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.2	0.6	0.5	0.3
di cui % psicofarmaci	1.0	1.1	3.0	1.6	1.9	2.6	1.9	2.7	1.2	3.2	2.3	2.2
% anche alcol	19.5	18.1	16.9	16.3	15.9	15.8	15.0	15.2	13.5	22.2	20.2	24.8
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	25.3	26.3	25.6	27.8	29.3	30.0	31.5	31.0	31.2	33.1	35.4	37.8
% Ospedale	6.9	7.1	8.7	9.3	8.3	8.1	8.1	8.4	6.4	6.5	6.8	8.4
% Psichiatria***	-	7.9	6.1	5.4	5.7	5.4	7.7	7.0	3.4	2.9	2.3	2.1
% Pronto soccorso	14.0	11.4	18.3	15.3	14.4	13.8	11.1	16.5	17.5	16.7	12.7	10.4
% SERT	80.3	79.5	76.6	78.1	80.0	78.6	80.5	77.5	75.9	77.4	78.9	81.8
di cui % anche Carcere	10.9	13.3	12.6	13.4	14.5	14.9	17.2	17.3	16.6	18.4	18.0	16.8
di cui % anche Unità Mobile Metadone	3.0	4.5	3.8	4.5	4.3	4.2	4.9	4.9	3.5	3.7	3.8	5.0

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali

** persone presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 2 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche "nuovi" contatti**. Periodo 2010-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	629	609	863	781	727	821	750	957	1026	902	950	1042
età media	34.9	37.0	36.9	35.8	35.7	36.9	36.9	38.9	38.8	34.9	36.4	36.2
% maschi	73.6	79.3	76.2	78.1	81.0	77.0	79.1	72.8	71.0	80.0	76.6	75.3
% femmine	26.4	20.7	23.8	21.9	19.0	23.0	20.9	27.2	29.0	20.0	23.4	24.7
% nativi	67.9	70.0	69.2	65.9	66.0	62.2	68.4	69.9	72.0	66.4	70.0	69.5
% non nativi	31.3	29.6	30.5	33.4	33.4	37.1	31.5	29.4	27.8	33.5	30.0	30.5
% residenti area metropolitana	63.4	63.1	64.2	58.9	59.7	55.7	60.3	62.6	65.1	51.6	57.2	53.1
% residenti fuori area metropolitana	32.0	33.2	32.4	38.3	36.9	39.5	37.7	34.7	32.4	46.6	42.7	43.6
% senza fissa dimora (SFD)	5.9	4.1	2.3	4.2	3.9	5.2	4.4	5.4	3.1	3.7	1.8	6.8
% decesso overdose	0.3	0.7	1.5	1.7	0.7	0.6	1.1	0.9	0.6	1.3	0.4	0.2
% oppioidi	27.3	29.6	24.8	26.0	30.4	33.1	38.0	45.9	28.2	44.6	48.9	48.6
di cui % oppioidi e cocaina	9.2	10.7	8.3	10.9	12.0	9.3	10.3	8.4	6.0	8.5	7.9	6.7
di cui % oppioidi e alcol (no cocaina)	1.9	2.0	1.3	0.8	1.7	1.3	2.9	3.7	1.2	3.8	4.9	3.6
di cui % solo oppioidi (no cocaina e no alcol)	16.2	16.9	15.2	14.3	16.8	22.5	24.8	33.9	21.0	32.3	36.1	38.3
% cocaina	42.0	44.0	41.7	43.8	46.1	34.8	35.1	27.4	23.4	26.3	24.8	21.8
di cui % cocaina e oppioidi	9.2	10.7	8.3	10.9	12.0	9.3	10.3	8.4	6.0	8.5	7.9	6.7
di cui % cocaina e alcol (no oppioidi)	9.5	10.2	8.6	6.9	6.5	4.4	4.9	4.0	4.1	3.2	2.9	3.4
di cui % solo cocaina (no oppioidi e no alcol)	23.2	23.2	24.8	26.0	27.6	21.2	19.9	15.0	13.3	14.5	14.0	11.7
% cannabinoidi	28.3	25.9	24.7	29.4	32.0	25.5	23.1	23.2	24.5	22.4	15.6	11.5
di cui % cannabis e alcol	5.2	5.1	3.0	4.6	4.3	2.6	3.3	3.0	3.3	4.7	2.8	1.3
di cui % cannabis e oppioidi+coca	0.2	0.0	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.9	0.2	0.2
di cui % cannabis e coca	6.5	5.4	6.7	8.2	10.5	8.8	6.4	4.9	4.1	4.1	1.9	0.8
di cui % cannabis e oppioidi	1.6	1.6	1.2	2.0	2.8	3.4	2.0	4.1	4.4	3.3	2.8	2.9
di cui % solo cannabis (no opp no coca no alc)	14.8	13.8	13.3	14.3	14.2	10.4	11.1	10.9	12.4	9.4	7.8	6.3
% altre sostanze illegali	24.8	21.3	23.2	20.7	19.3	25.5	21.2	25.3	19.2	26.8	28.3	29.8
di cui % allucinogeni	1.6	0.8	0.9	0.5	0.4	0.2	1.1	0.3	0.5	0.9	1.7	0.0
di cui % amfetamine	2.1	0.8	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	0.8	0.4	1.2	0.9
di cui % crack	1.1	1.1	1.4	1.0	0.8	0.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.9	0.0
di cui % ecstasy	0.3	0.8	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2
di cui % GHB	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % ketamina	0.8	0.3	0.5	0.4	0.6	0.5	0.1	0.2	0.3	0.4	0.1	0.4
di cui % altra non indicata	20.5	18.6	20.3	18.7	17.3	23.9	16.7	23.7	15.7	19.3	25.2	27.9
% abuso concomitante di psicofarmaci	4.5	4.1	10.5	10.1	6.7	11.1	9.7	11.1	25.4	7.6	6.8	16.1
di cui % benzodiazepine	2.4	2.3	8.3	7.3	3.9	6.9	6.1	6.6	4.7	2.9	2.3	4.1
di cui % antidepressivi	0.0	0.0	0.8	0.8	0.3	0.7	0.3	0.5	2.3	1.2	1.3	5.8
di cui % barbiturici	0.6	0.8	0.5	0.8	0.8	0.5	0.8	1.0	0.4	0.6	1.3	0.2
di cui % psicofarmaci	2.1	2.5	6.6	2.4	3.7	3.9	2.9	5.2	2.0	4.0	3.6	5.0
% anche alcol	21.8	22.0	18.4	16.9	18.0	16.8	16.3	16.5	13.9	20.3	18.9	14.9
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	4.5	6.1	4.9	6.4	8.1	5.7	7.2	8.8	5.8	13.2	12.0	14.4
% Ospedale	19.1	20.7	22.6	19.1	17.5	16.6	21.2	18.8	11.0	10.3	15.8	21.3
% Psichiatria***	-	6.7	4.3	3.6	0.0	3.0	4.0	9.2	3.0	2.5	1.3	1.6
% Pronto soccorso	34.8	27.9	32.0	33.5	35.1	31.5	24.9	34.2	33.5	35.7	25.4	22.3
% SERT	46.9	46.6	43.5	46.9	52.7	49.3	52.3	42.6	37.2	49.8	53.2	56.5
di cui % anche Carcere	9.2	12.5	13.7	15.2	20.1	20.7	17.5	13.8	14.0	24.8	22.8	20.9
di cui % anche Unità Mobile Metadone	2.7	4.3	2.7	4.4	4.7	4.4	6.0	6.9	3.4	4.2	3.4	7.2

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali

** persone presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 3 - Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche persone non native. Periodo 2010-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	759	730	791	754	716	779	797	815	795	793	763	765
% nuovi contatti**	26.0	24.7	33.2	34.6	33.9	39.2	29.6	34.5	35.8	38.1	37.4	41.6
età media	36.4	36.0	35.7	34.7	34.8	34.9	34.6	33.7	33.9	33.2	33.2	32.7
% maschi	86.7	89.0	86.9	86.9	87.8	86.1	89.7	90.1	89.3	91.0	88.5	88.2
% femmine	13.3	11.0	13.1	13.1	12.2	13.9	10.3	9.9	10.7	9.0	11.5	11.8
% residenti area metropolitana	52.2	47.5	51.2	44.7	43.2	39.2	38.3	36.0	35.6	33.0	34.6	34.0
% residenti fuori area metropolitana	39.1	44.2	42.2	48.7	47.2	53.8	56.8	58.2	58.5	63.2	65.3	59.9
% senza fissa dimora (SFD)	15.5	15.8	11.9	12.6	13.0	12.7	9.0	12.0	9.1	6.6	7.5	9.2
% decesso overdose	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.5	0.6	0.1	0.0
% oppioidi												
% oppioidi	48.4	53.2	49.6	51.9	54.5	57.9	63.2	65.0	62.3	68.0	73.1	71.1
di cui % oppioidi e cocaina	20.7	24.8	19.8	22.0	21.5	17.8	19.2	17.4	13.8	17.4	15.5	13.1
di cui % oppioidi e alcol (no cocaina)	3.3	3.0	3.3	3.1	2.9	3.1	3.5	3.7	3.0	5.9	6.4	8.4
di cui % solo oppioidi (no cocaina e no alcol)	24.4	25.3	26.4	26.8	30.0	37.0	40.5	43.9	45.4	44.6	51.2	49.7
% cocaina												
% cocaina	52.2	54.8	51.5	50.9	49.7	40.9	39.5	36.6	31.3	33.2	28.2	27.7
di cui % cocaina e oppioidi	20.7	24.8	19.8	22.0	21.5	17.8	19.2	17.4	13.8	17.4	15.5	13.1
di cui % cocaina e alcol (no oppioidi)	9.6	9.2	7.3	6.1	5.6	5.1	4.9	3.9	2.5	2.1	1.3	3.1
di cui % solo cocaina (no oppioidi e no alcol)	21.9	20.8	24.3	22.8	22.6	18.0	15.4	15.2	15.0	13.6	11.4	11.5
% cannabinoidi												
% cannabinoidi	22.8	21.6	24.0	25.2	23.3	21.8	18.3	21.5	20.0	17.2	12.2	10.2
di cui % cannabis e alcol	4.9	4.0	3.4	3.2	2.9	1.5	2.1	2.3	2.9	2.9	1.0	0.9
di cui % cannabis e oppioidi+coca	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.1	0.6	1.8	1.0	0.3
di cui % cannabis e coca	9.4	9.0	10.4	11.3	10.9	9.1	6.6	7.2	5.3	3.9	1.6	2.2
di cui % cannabis e oppioidi	2.5	3.2	2.7	3.4	3.1	5.8	4.1	6.7	6.3	4.0	3.9	4.1
di cui % solo cannabis (no opp no coca no alc)	5.8	5.1	7.0	7.0	6.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.5	4.6	2.7
% altre sostanze illegali												
% altre sostanze illegali	13.2	11.9	11.1	12.5	13.1	12.5	10.5	11.7	9.9	12.9	11.1	11.1
% abuso concomitante di psicofarmaci	2.2	2.5	6.2	4.6	3.8	5.5	4.8	6.0	7.3	3.9	4.6	5.5
di cui % benzodiazepine	1.7	1.1	3.8	2.3	2.2	3.3	2.6	4.2	2.9	2.5	2.4	1.8
% anche alcol	22.1	19.6	17.7	16.0	15.9	15.1	12.7	13.1	12.1	19.2	14.2	18.6
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	10.5	11.6	11.1	12.3	12.6	12.8	14.4	14.4	14.5	14.8	16.5	17.3
% Ospedale												
% Ospedale	7.2	6.7	9.7	8.8	5.9	5.1	6.3	5.8	5.2	4.7	5.2	5.6
% Psichiatria***												
% Psichiatria***	-	4.7	2.1	2.5	2.4	2.3	3.0	2.2	0.8	1.1	0.8	0.7
% Pronto soccorso												
% Pronto soccorso	17.0	15.2	22.4	19.6	18.2	18.1	12.9	15.6	17.4	15.4	11.0	14.0
% SERT												
% SERT	77.6	78.5	75.0	75.3	79.5	77.4	80.2	80.9	78.0	78.4	81.0	81.4
di cui % anche Carcere	29.6	33.4	32.2	35.3	39.1	40.3	46.2	49.7	48.1	53.5	51.4	48.2
di cui % anche Unità Mobile Metadone	7.4	12.9	10.9	13.0	13.0	13.0	13.9	14.7	10.1	9.7	11.1	13.7
Area provenienza												
% Europa Est	28.1	25.8	24.9	26.5	23.0	22.5	21.7	20.4	18.7	18.7	19.0	19.5
% Altri paesi europei	6.9	7.9	9.7	8.6	9.2	8.9	9.0	9.1	11.7	10.5	11.1	13.5
% Africa Mediterranea	43.5	46.7	42.7	44.0	49.4	52.2	53.8	55.2	55.0	56.0	55.3	54.5
% Altra Africa	6.2	5.2	6.3	5.2	4.3	3.2	3.5	2.7	3.3	2.5	3.7	2.7
% Asia	9.0	7.9	8.7	9.0	8.7	7.7	7.7	7.6	6.2	6.8	6.0	5.4
% America Latina	6.1	6.2	6.8	6.2	5.3	5.1	4.1	4.8	3.8	3.5	3.9	3.8
% USA e Canada	0.3	0.3	0.6	0.4	0.0	0.3	0.0	0.2	0.5	0.4	0.5	0.4
% Altro	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.9	1.6	0.4	0.3
Nazione												
% Marocco	19.4	20.4	21.4	21.4	22.6	21.7	21.0	20.0	21.0	22.4	21.8	22.1
% Tunisia	19.1	21.0	16.6	17.9	21.4	25.8	26.2	28.3	26.3	25.6	24.0	22.0
% Albania	6.1	5.1	4.8	5.4	3.5	3.6	3.4	3.9	4.2	3.3	2.5	4.1
% Moldova	4.7	3.6	3.4	3.1	2.8	2.1	2.5	2.0	2.6	2.5	2.9	1.8
% Romania	4.5	4.0	4.7	5.6	4.5	5.4	4.9	5.8	4.3	5.0	4.6	3.8

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali

** persone presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 4 - Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche "nuovi" contatti di persone non native. Periodo 2010-2021**

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	197	180	263	261	243	305	236	281	285	302	285	318
età media	33.0	32.4	33.1	30.7	31.4	32.5	32.5	30.0	31.6	31.1	31.1	31.3
% maschi	82.7	85.6	85.6	87.0	88.5	86.2	90.3	85.8	84.9	90.1	82.8	86.5
% femmine	17.3	14.4	14.4	13.0	11.5	13.8	9.7	14.2	15.1	9.9	17.2	13.5
% residenti area metropolitana	50.3	41.1	49.0	37.9	31.7	32.1	35.6	35.6	37.5	30.8	31.6	28.0
% residenti fuori area metropolitana	38.6	51.1	46.8	55.6	62.6	59.3	60.2	58.7	55.8	65.2	68.4	63.8
% senza fissa dimora (SFD)	12.7	8.9	6.8	10.0	6.2	12.1	6.8	12.5	7.4	4.3	3.9	11.0
% decesso overdose	0.5	1.7	0.0	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	1.1	1.7	0.4	0.0

% oppioidi	28.9	31.1	27.4	30.3	33.7	40.0	45.8	48.0	40.4	49.3	55.1	60.7
di cui % oppioidi e cocaina	9.1	15.0	10.3	14.9	16.9	14.8	18.2	13.2	9.8	7.9	7.0	5.0
di cui % oppioidi e alcol (no cocaina)	2.0	2.2	1.9	1.1	1.2	1.0	3.0	2.5	2.5	3.6	3.9	3.1
di cui % solo oppioidi (no cocaina e no alcol)	17.8	13.9	15.2	14.2	15.6	24.3	24.6	32.4	28.1	37.7	44.2	52.5

% cocaina	41.6	51.1	47.9	51.7	52.3	44.3	40.3	33.1	28.4	28.8	24.2	18.6
di cui % cocaina e oppioidi	9.1	15.0	10.3	14.9	16.9	14.8	18.2	13.2	9.8	7.9	7.0	5.0
di cui % cocaina e alcol (no oppioidi)	11.2	12.2	8.0	8.4	6.2	5.6	3.4	4.6	3.5	3.0	2.1	0.9
di cui % solo cocaina (no oppioidi e no alcol)	21.3	23.9	29.7	28.4	29.2	23.9	18.6	15.3	15.1	17.9	15.1	12.6

% cannabinoidi	27.9	23.9	29.7	32.6	34.6	31.5	24.6	30.2	28.1	23.2	14.7	7.5
di cui % cannabis e alcol	9.1	6.7	5.7	5.0	4.9	1.6	4.2	2.1	4.2	5.3	1.4	0.3
di cui % cannabis e oppioidi+coca	0.0	0.0	0.8	0.4	0.4	0.7	0.0	0.4	0.4	0.7	0.4	0.3
di cui % cannabis e coca	7.1	7.2	8.0	11.9	14.8	13.8	8.1	8.9	7.4	7.0	1.4	0.3
di cui % cannabis e oppioidi	1.5	1.7	2.3	2.7	2.9	4.6	3.0	7.5	7.4	3.3	2.8	1.6
di cui % solo cannabis (no opp no coca no alc)	10.2	8.3	12.9	12.6	11.5	10.8	9.3	11.4	8.8	7.0	8.8	5.0

% altre sostanze illegali	25.4	21.7	17.1	16.5	15.6	17.0	19.1	22.4	18.9	20.2	20.4	20.4
% abuso concomitante di psicofarmaci	2.0	5.0	8.4	6.5	4.9	6.2	5.5	7.8	13.3	4.6	4.6	6.6
di cui % benzodiazepine	1.5	1.7	6.1	3.1	2.9	3.9	1.7	5.0	3.9	1.0	1.8	1.6
% anche alcol	27.9	27.2	20.5	18.4	16.9	15.4	14.0	13.9	15.1	20.9	14.4	12.3
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	3.6	5.0	3.0	6.5	7.0	4.9	6.8	8.5	4.6	11.3	8.8	10.4

% Ospedale	14.7	16.1	17.9	13.0	8.6	6.6	12.7	11.0	6.3	5.6	10.5	8.5
% Psichiatria***	-	4.4	0.8	1.5	0.0	2.6	1.7	5.0	0.7	1.7	0.0	0.6
% Pronto soccorso	34.0	32.2	34.6	36.4	32.5	29.2	26.7	29.2	34.4	28.8	21.1	23.6
% SERT	51.8	50.6	52.1	52.5	60.9	63.9	58.1	59.1	51.9	60.6	64.6	67.9
di cui % anche Carcere	16.2	23.9	27.0	29.1	41.2	39.3	33.5	33.8	33.3	47.7	48.1	45.3
di cui % anche Unità Mobile Metadone	4.1	7.8	6.1	10.0	7.4	8.5	12.3	14.6	8.1	6.0	6.7	13.2
Area provenienza												
% Europa Est	35.0	30.6	25.9	30.3	24.3	21.0	21.6	23.5	21.8	20.9	20.4	22.0
% Altri paesi europei	3.0	3.9	9.1	5.4	5.3	4.6	6.4	3.9	7.4	7.6	6.0	8.2
% Africa Mediterranea	35.5	45.0	38.4	40.6	50.6	55.4	52.5	54.8	54.4	54.0	58.2	56.3
% Altra Africa	8.1	7.2	11.0	7.3	7.0	4.3	5.9	2.5	5.3	2.3	4.9	4.1
% Asia	9.6	7.2	8.0	9.6	9.5	9.8	10.2	10.3	5.3	7.6	5.6	6.0
% America Latina	7.6	6.1	5.7	5.7	3.3	4.3	3.4	5.0	4.2	3.6	3.5	0.0
% USA e Canada	0.5	0.0	1.5	1.1	0.0	0.7	0.0	0.0	1.1	0.3	0.4	3.1
% Altro	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.6	1.1	0.3
Nazione												
% Marocco	19.8	20.6	22.4	23.4	28.8	25.2	22.9	21.7	23.9	20.2	24.9	22.0
% Tunisia	12.7	20.0	12.5	14.9	16.5	27.2	27.5	29.5	25.6	29.1	26.3	26.7
% Albania	10.7	7.8	6.5	8.4	2.9	5.6	4.7	3.2	5.3	4.6	1.8	5.3
% Moldova	8.1	3.9	3.4	1.9	3.3	1.3	1.7	0.7	2.5	2.0	3.5	1.6
% Romania	7.1	5.6	6.5	7.7	7.4	6.6	4.2	11.7	7.4	8.6	7.4	6.6

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali

** persone presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 5 - Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche persone minorenni. Periodo 2010-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	39	24	31	43	42	45	25	26	23	20	21	15
% nuovi contatti**	84.6	87.5	80.6	90.7	69.0	77.8	80.0	84.6	95.7	100.0	95.2	100.0
età media	16.0	16.3	16.1	16.3	16.3	16.1	16.1	16.3	16.2	15.8	16.4	16.1
% maschi	56.4	70.8	67.7	55.8	69.0	75.6	84.0	88.5	60.9	85.0	85.7	60.0
% femmine	43.6	29.2	32.3	44.2	31.0	24.4	16.0	11.5	39.1	15.0	14.3	40.0
% nativi	69.2	87.5	67.7	67.4	76.2	71.1	76.0	69.2	78.3	45.0	71.4	80.0
% non nativi	30.8	12.5	32.3	32.6	23.8	28.9	24.0	30.8	21.7	55.0	28.6	20.0
% residenti area metropolitana	79.5	83.3	87.1	90.7	81.0	80.0	84.0	88.5	87.0	75.0	81.0	73.3
% residenti fuori area metropolitana	20.5	16.7	12.9	7.0	16.7	15.6	16.0	11.5	13.0	15.0	19.0	26.7
% senza fissa dimora (SFD)	0.0	0.0	0.0	2.3	2.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

% oppioidi	5.1	0.0	6.5	16.3	16.7	17.8	16.0	11.5	13.0	5.0	9.5	20.0
di cui % oppioidi e cocaina	0.0	0.0	0.0	2.3	2.4	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % oppioidi e alcol (no cocaina)	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7
di cui % solo oppioidi (no cocaina e no alcol)	2.6	0.0	6.5	14.0	14.3	17.8	12.0	11.5	13.0	5.0	9.5	13.3

% cocaina	10.3	8.3	9.7	20.9	9.5	20.0	12.0	11.5	0.0	0.0	4.8	0.0
di cui % cocaina e oppioidi	0.0	0.0	0.0	2.3	2.4	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % cocaina e alcol (no oppioidi)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % solo cocaina (no oppioidi e no alcol)	10.3	8.3	9.7	18.6	7.1	17.8	4.0	11.5	0.0	0.0	4.8	0.0

% cannabinoidi	79.5	87.5	74.2	74.4	66.7	57.8	72.0	69.2	52.2	60.0	66.7	46.7
di cui % cannabis e alcol	12.8	12.5	9.7	9.3	14.3	2.2	4.0	11.5	8.7	10.0	23.8	0.0
di cui % cannabis e oppioidi+coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % cannabis e coca	10.3	4.2	6.5	14.0	0.0	15.6	8.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % cannabis e oppioidi	0.0	0.0	3.2	7.0	4.8	2.2	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	6.7
di cui % solo cannabis (no opp no coca no alc)	56.4	70.8	54.8	44.2	47.6	37.8	56.0	46.2	39.1	50.0	42.9	40.0

% altre sostanze illegali	15.4	8.3	19.4	14.0	23.8	24.4	20.0	42.3	26.1	40.0	19.0	40.0
% abuso concomitante di psicofarmaci	5.1	8.3	6.5	4.7	4.8	2.2	8.0	3.8	17.4	0.0	4.8	20.0
di cui % benzodiazepine	2.6	4.2	3.2	2.3	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7
% anche alcol	17.9	12.5	12.9	14.0	14.3	11.1	24.0	19.2	17.4	25.0	28.6	13.3
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	3.8	0.0	5.0	4.8	6.7

% Ospedale	15.4	4.2	9.7	18.6	11.9	6.7	8.0	19.2	21.7	0.0	4.8	13.3
% Psichiatria***	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% Pronto soccorso	46.2	50.0	61.3	58.1	54.8	31.1	44.0	46.2	47.8	75.0	52.4	46.7
% SERT	43.6	50.0	35.5	34.9	42.9	66.7	60.0	38.5	26.1	25.0	47.6	46.7
di cui % anche Carcere Minorile	0.0	0.0	0.0	7.0	7.1	13.3	-	-	-	-	-	-
di cui % anche Carcere	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.0	3.8	0.0	0.0	9.5	0.0
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali

** persone presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 6 - Consumo problematico di oppioidi*. Caratteristiche persone. Periodo 2010-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	1952	2038	2110	2094	2138	2281	2418	2600	2495	2877	3019	2872
% nuovi contatti**	8.8	8.8	10.1	9.7	10.3	11.9	11.8	16.9	11.6	14.0	15.4	17.6
età media	44.7	44.3	43.6	42.9	42.2	41.3	41.0	41.0	39.7	39.5	39.3	37.3
% maschi	78.6	78.7	78.8	78.8	78.3	79.0	79.9	78.7	80.1	79.3	79.4	80.1
% femmine	21.4	21.3	21.2	21.2	21.7	21.0	20.1	21.3	19.9	20.7	20.6	19.9
% nativi	81.0	80.8	81.2	81.1	81.5	80.0	79.1	79.3	80.0	81.3	81.5	81.1
% non nativi	18.8	19.0	18.6	18.7	18.2	19.8	20.8	20.4	19.8	18.7	18.5	18.9
% residenti area metropolitana	81.2	80.0	81.5	78.6	81.0	73.5	74.7	74.3	71.6	71.7	72.1	68.9
% residenti fuori area metropolitana	15.8	16.3	15.7	18.9	15.5	24.2	23.4	23.5	26.2	27.0	27.8	28.7
% senza fissa dimora (SFD)	8.0	8.7	6.5	7.1	7.0	6.4	6.7	7.0	6.3	4.6	4.1	7.2
% decesso overdose	0.3	0.2	0.6	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5	0.8	0.4	0.3	0.1
di cui % oppioidi e cocaina	35.6	34.5	30.0	29.8	27.6	21.8	21.3	19.1	16.7	24.7	21.6	16.7
di cui % oppioidi e alcol (no cocaina)	7.7	7.7	7.3	7.6	6.9	7.1	7.8	8.3	7.5	14.0	14.3	17.5
di cui % solo oppioidi (no cocaina e no alcol)	56.7	57.8	62.7	62.6	65.5	71.1	70.9	72.5	75.8	61.3	64.1	65.8
% cannabinoidi	6.9	7.2	6.9	7.5	7.6	9.2	6.9	7.3	8.0	10.5	8.9	7.0
% altre sostanze illegali	3.6	4.6	3.8	5.3	4.5	3.6	3.8	7.3	3.7	7.0	5.0	1.7
% abuso concomitante di psicofarmaci	2.2	1.6	2.7	2.7	2.4	4.6	3.3	3.4	2.4	3.8	5.0	3.6
di cui % benzodiazepine	1.7	1.2	1.6	1.5	1.4	2.3	1.7	1.6	1.6	3.5	2.6	1.6
% anche alcol	9.5	9.1	8.5	9.2	8.3	8.2	9.0	9.5	8.2	18.6	18.2	22.3
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	41.9	42.3	42.8	43.7	44.7	45.0	44.9	43.4	46.6	43.4	44.7	50.1
% Ospedale	3.9	4.5	4.2	5.8	5.4	4.8	4.0	5.2	4.7	4.9	3.8	3.5
% Psichiatria***	-	4.5	4.1	4.0	3.6	3.6	4.4	3.7	2.3	2.1	1.7	1.5
% Pronto soccorso	6.3	5.4	13.2	8.2	6.6	6.0	5.7	12.8	11.3	11.6	10.5	6.9
% SERT	95.5	94.7	93.7	95.1	95.5	94.5	94.7	90.3	94.3	88.4	87.2	93.5
di cui % anche Carcere	8.2	11.2	10.8	12.2	12.5	15.1	17.0	17.1	17.6	18.4	17.4	17.2
di cui % anche Unità Mobile Metadone	4.2	7.2	6.1	6.6	6.5	6.4	7.1	7.0	5.3	4.8	4.9	6.7

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di oppioidi

** persone presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 7 - Consumo problematico di oppioidi*. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2010-2021**

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	172	180	214	203	221	272	285	439	289	402	465	506
età media	37.3	38.9	38.9	37.2	36.7	34.7	37.3	41.7	35.0	35.1	36.6	33.0
% maschi	69.8	74.4	75.7	78.8	75.6	78.3	80.0	70.6	81.7	81.3	78.5	83.4
% femmine	30.2	25.6	24.3	21.2	24.4	21.7	20.0	29.4	18.3	18.7	21.5	16.6
% nativi	66.3	68.3	66.4	60.1	62.4	55.1	62.1	68.3	59.5	62.9	66.2	61.9
% non nativi	33.1	31.1	33.6	38.9	37.1	44.9	37.9	30.8	39.8	37.1	33.8	38.1
% residenti area metropolitana	55.8	54.4	53.3	40.9	55.7	41.2	47.0	52.6	37.7	38.1	47.3	35.8
% residenti fuori area metropolitana	36.0	37.2	39.7	52.7	38.9	50.7	48.8	42.4	54.0	59.2	52.5	58.1
% senza fissa dimora (SFD)	14.0	11.7	7.0	12.3	9.5	11.8	10.2	10.9	9.7	8.0	3.7	13.4
% decesso overdose	0.0	0.0	3.3	1.0	1.8	1.8	2.8	2.1	2.1	2.0	0.9	0.2

di cui % oppioidi e cocaina	33.7	36.1	33.6	41.9	39.4	27.9	27.0	18.2	21.5	19.2	16.1	13.8
di cui % oppioidi e alcol (no cocaina)	7.0	6.7	5.1	3.0	5.4	4.0	7.7	8.0	4.2	8.5	10.1	7.3
di cui % solo oppioidi (no cocaina e no alcol)	59.3	57.2	61.2	55.2	55.2	68.0	65.3	73.8	74.4	72.4	73.8	78.9

% cannabinoidi	6.4	5.6	6.5	8.9	10.4	11.4	6.0	9.6	16.6	9.5	6.2	6.3
% altre sostanze illegali	8.1	4.4	6.5	5.4	2.3	1.8	2.1	10.5	2.8	4.5	7.3	1.2
% abuso concomitante di psicofarmaci	4.7	0.6	6.1	4.4	6.3	7.0	7.4	3.6	4.2	5.5	6.7	5.3
di cui % benzodiazepine	2.3	0.0	1.9	1.5	1.8	2.9	2.5	0.2	1.7	2.7	1.7	0.8

% anche alcol	8.1	7.8	6.1	5.4	6.3	5.1	8.4	8.9	4.5	11.7	14.4	11.1
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	15.1	20.0	17.3	22.2	24.9	15.4	18.2	18.7	20.1	29.6	24.3	28.9

% Ospedale	20.9	22.2	22.4	15.8	14.0	11.8	15.1	14.6	11.8	5.5	8.0	5.3
% Psichiatria***	-	3.9	4.7	2.0	0.0	0.7	1.4	3.6	1.7	1.0	0.2	1.6
% Pronto soccorso	18.0	13.9	22.0	18.7	15.8	15.1	11.9	30.5	18.7	20.9	20.2	12.3
% SERT	68.6	67.8	58.4	72.4	79.2	74.3	73.3	56.0	72.7	75.6	71.6	81.4
di cui % anche Carcere	10.5	16.1	13.1	25.6	25.8	32.0	21.8	17.5	28.4	38.6	28.8	30.4
di cui % anche Unità Mobile Metadone	7.0	13.9	9.8	14.3	13.6	11.8	15.4	15.0	12.1	9.5	6.9	14.6

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di oppioidi

** persone presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 8 - Consumo problematico di cocaina*. Caratteristiche persone. Periodo 2010-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	1556	1505	1487	1370	1289	1121	1091	1033	933	1115	1023	955
% nuovi contatti**	17.0	17.8	24.2	25.0	26.0	25.5	24.1	25.4	25.7	21.3	23.1	23.8
età media	40.6	39.8	39.0	38.8	38.6	38.1	37.9	38.0	37.9	38.0	38.0	37.3
% maschi	82.1	82.3	82.6	84.2	83.6	84.6	84.8	85.7	87.0	85.6	85.4	86.0
% femmine	17.9	17.7	17.4	15.8	16.4	15.4	15.2	14.3	13.0	14.4	14.6	14.0
% nativi	74.3	73.3	72.4	71.9	72.2	71.5	70.9	71.0	73.0	76.4	79.0	77.8
% non nativi	25.4	26.6	27.4	28.0	27.6	28.5	28.9	28.8	26.7	23.6	21.0	22.2
% residenti area metropolitana	74.6	72.4	73.4	70.7	71.1	67.3	68.3	67.2	67.8	67.7	69.8	67.0
% residenti fuori area metropolitana	22.6	24.1	23.9	26.9	25.8	30.2	30.0	30.3	29.9	30.9	30.0	32.1
% senza fissa dimora (SFD)	8.2	8.6	5.6	5.7	5.5	5.6	5.0	6.7	4.9	5.5	4.6	6.0
% decesso overdose	0.2	0.3	0.4	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.1
di cui % cocaina e oppioidi	44.7	46.7	42.6	45.5	45.8	44.4	47.3	48.1	44.6	63.9	63.6	50.2
di cui % cocaina e alcol (no oppioidi)	18.6	16.8	16.7	13.3	13.7	14.9	14.7	14.0	13.7	9.9	8.6	15.9
di cui % solo cocaina (no oppioidi e no alcol)	36.8	36.5	40.7	41.2	40.6	40.7	38.0	37.9	41.7	26.3	27.8	33.9
% cannabinoidi	11.8	11.8	13.0	13.9	14.0	15.1	12.4	11.0	10.1	13.0	8.8	6.7
% altre sostanze illegali	5.3	6.0	5.2	6.3	8.5	5.5	6.1	9.5	5.4	9.2	7.5	2.3
% abuso concomitante di psicofarmaci	2.2	2.3	3.7	3.1	3.6	3.9	3.2	3.2	3.0	7.8	6.5	5.4
di cui % benzodiazepine	1.3	1.3	2.0	1.8	1.9	2.0	1.4	1.5	1.3	3.7	2.7	1.8
% anche alcol	20.8	18.7	18.6	15.7	16.0	17.3	17.3	16.8	15.4	21.7	19.8	30.9
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	21.5	22.0	21.0	22.7	23.9	24.7	25.2	26.6	27.0	30.8	32.8	29.3
% Ospedale	6.3	7.4	6.7	8.2	9.6	7.9	6.5	6.1	6.4	5.7	6.3	4.8
% Psichiatria***	-	5.7	4.8	4.2	5.3	6.4	8.2	6.9	3.8	2.4	2.7	1.9
% Pronto soccorso	12.3	11.5	17.6	14.2	14.7	13.5	12.5	14.7	18.8	17.4	14.7	10.6
% SERT	84.6	84.8	83.1	84.2	83.9	83.4	84.6	83.7	84.2	85.1	85.6	84.2
di cui % anche Carcere	18.1	22.8	22.5	25.0	27.5	27.2	31.6	31.3	28.4	27.6	27.9	28.3
di cui % anche Unità Mobile Metadone	3.0	5.3	4.2	5.3	5.2	5.0	1.9	6.7	4.4	5.4	5.0	3.5

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di cocaina

** persone presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 9 - Consumo problematico di cocaina*. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2010-2021**

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	264	268	360	342	335	286	263	262	240	237	236	227
età media	36.2	36.8	34.6	34.2	34.7	34.0	34.7	33.6	34.2	34.3	35.5	35.6
% maschi	79.2	83.6	83.9	87.4	86.6	86.4	87.1	86.6	90.8	91.1	86.0	88.5
% femmine	20.8	16.4	16.1	12.6	13.4	13.6	12.9	13.4	9.2	8.9	14.0	11.5
% nativi	67.4	65.3	64.7	60.5	62.1	52.8	63.5	64.1	65.8	63.3	70.8	74.0
% non nativi	31.1	34.3	35.0	39.5	37.9	47.2	36.1	35.5	33.8	36.7	29.2	26.0
% residenti area metropolitana	61.7	59.0	60.8	53.2	53.7	43.7	52.1	50.8	55.4	49.8	59.7	55.1
% residenti fuori area metropolitana	33.0	36.2	36.1	43.6	42.4	50.7	46.0	45.0	41.3	48.1	40.3	43.2
% senza fissa dimora (SFD)	8.0	5.6	3.1	6.4	5.4	7.0	4.2	9.5	6.3	5.9	1.7	5.7
% decesso overdose	0.0	0.4	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.8	0.0	1.3	0.4	0.0

di cui % cocaina e oppioidi	22.0	24.3	20.0	24.9	26.0	26.6	29.3	30.5	25.8	32.5	31.8	30.8
di cui % cocaina e alcol (no oppioidi)	22.7	23.1	20.6	15.8	14.0	12.6	14.1	14.5	17.5	12.2	11.9	15.4
di cui % solo cocaina (no oppioidi e no alcol)	55.3	52.6	59.4	59.4	60.0	60.8	56.7	55.0	56.7	55.3	56.4	53.7

% cannabinoidi	15.9	12.3	17.2	19.3	23.6	26.2	19.0	19.1	18.8	19.0	8.5	4.4
% altre sostanze illegali	7.6	4.5	5.0	4.4	7.5	3.8	5.7	13.0	3.8	5.5	11.9	1.3
% abuso concomitante di psicofarmaci	2.7	3.7	4.4	3.2	3.0	2.4	3.0	3.1	3.8	5.1	8.5	7.0
di cui % benzodiazepine	1.9	2.2	3.1	2.3	1.8	1.0	0.8	1.1	0.8	3.0	2.5	0.9

% anche alcol	23.5	23.9	21.1	17.3	14.6	13.6	14.8	16.0	17.9	17.7	19.9	26.0
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	5.3	7.5	6.9	9.6	10.4	8.0	8.4	11.5	12.1	12.2	8.9	12.3

% Ospedale	15.9	16.8	10.6	8.2	12.5	8.0	8.7	9.2	5.0	3.4	11.0	7.9
% Psichiatria***	-	4.1	2.8	2.6	0.0	2.8	4.6	8.0	5.4	2.5	2.1	1.8
% Pronto soccorso	22.0	21.3	26.7	24.0	26.6	21.0	17.9	23.7	31.3	28.3	29.2	21.1
% SERT	64.4	61.9	65.6	69.3	69.3	73.4	74.9	68.7	65.4	64.1	62.3	66.5
di cui % anche Carcere	15.5	21.6	23.6	28.4	33.4	39.5	35.4	26.0	30.8	35.9	30.9	28.2
di cui % anche Unità Mobile Metadone	2.7	4.5	2.8	7.0	5.4	5.6	6.1	10.7	6.3	5.9	3.8	3.5

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di cocaina

** persone presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 10 - Consumo problematico di cannabinoidi*. Caratteristiche persone. Periodo 2010-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	587	567	613	592	570	583	512	533	530	572	472	401
% nuovi contatti**	30.3	27.9	34.7	38.9	40.9	35.8	33.8	41.7	47.4	35.3	31.4	29.9
età media	34.9	34.7	33.7	33.3	33.36	34.26	33.37	33.0	32.2	34.39	33.54	33.22
% maschi	81.8	86.4	86.1	85.5	85.6	85.8	84.8	87.2	88.7	85.5	86.0	87.8
% femmine	18.2	13.6	13.9	14.5	14.4	14.2	15.2	12.8	11.3	14.5	14.0	12.2
% nativi	70.5	72.1	68.7	67.9	70.7	70.8	71.3	66.8	69.8	76.2	80.3	80.5
% non nativi	29.5	27.9	31.0	32.1	29.3	29.2	28.5	32.8	30.0	23.8	19.7	19.5
% residenti area metropolitana	74.3	74.3	76.2	73.0	73.0	69.3	73.6	69.4	67.5	76.2	77.3	72.1
% residenti fuori area metropolitana	23.9	24.5	23.0	26.0	25.6	28.5	25.6	29.3	31.3	23.4	22.7	27.4
% senza fissa dimora (SFD)	4.6	4.4	2.0	3.2	3.3	3.1	2.9	3.8	2.8	3.8	3.6	5.5
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5
di cui % cannabis e alcol	16.5	14.3	12.1	13.3	12.8	11.3	12.9	12.4	11.5	12.1	9.3	13.7
di cui % cannabis e oppioidi+coca	1.9	2.5	1.6	3.2	2.3	2.2	3.3	1.1	1.9	12.4	9.1	4.5
di cui % cannabis e coca	29.5	28.7	30.0	29.1	29.5	26.8	23.0	20.3	15.8	12.9	10.0	11.5
di cui % cannabis e oppioidi	21.1	23.5	22.2	23.3	26.1	33.6	29.5	34.5	35.8	40.2	47.9	45.4
di cui % solo cannabis (no opp no coca no alc)	31.0	31.0	34.1	31.1	29.3	26.1	31.3	31.7	34.9	22.4	23.7	24.9
% altre sostanze illegali	4.4	6.5	7.8	8.3	9.1	6.5	8.8	10.9	6.6	8.7	7.0	5.2
% abuso concomitante di psicofarmaci	1.9	2.3	3.6	2.5	1.9	1.9	2.9	3.2	3.2	6.5	5.1	4.5
di cui % benzodiazepine	0.7	1.1	2.0	1.7	0.5	0.5	0.8	0.8	1.3	3.3	3.2	2.0
% anche alcol	21.0	18.2	15.8	16.9	15.6	16.6	15.6	17.1	14.2	22.0	16.7	24.4
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	9.0	9.2	9.6	10.1	10.9	14.1	10.2	9.6	11.1	17.8	23.5	19.7
% Ospedale	9.5	9.3	12.1	14.2	10.7	10.6	11.3	9.8	10.8	8.0	6.4	6.7
% Psichiatria***	-	11.5	9.1	6.4	7.9	8.7	10.4	7.9	5.7	3.8	4.4	3.7
% Pronto soccorso	22.3	17.8	23.7	23.8	22.1	15.3	13.5	19.5	26.2	18.4	16.9	11.2
% SERT	68.5	69.7	67.4	66.9	70.9	76.7	75.2	71.9	69.8	76.6	81.4	80.0
di cui % anche Carcere	15.5	19.4	19.2	21.1	23.2	23.2	24.8	26.6	21.9	17.0	14.6	17.0
di cui % anche Unità Mobile Metadone	2.9	2.3	0.7	1.4	0.9	1.4	0.8	1.9	0.9	2.4	2.3	1.2

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di cannabinoidi

** persone presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 11 - Consumo problematico di cannabinoidi*. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2010-2021**

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	178	158	213	230	233	209	173	222	251	202	148	120
età media	28.5	28.8	28.6	27.6	29.2	29.6	29.6	29.6	28.4	30.4	29.3	29.7
% maschi	77.0	83.5	87.3	83.5	87.6	87.1	83.8	86.0	87.6	87.1	83.1	86.7
% femmine	23.0	16.5	12.7	16.5	12.4	12.9	16.2	14.0	12.4	12.9	16.9	13.3
% nativi	69.1	72.8	62.9	63.0	63.9	54.1	66.5	60.8	68.1	65.3	71.6	80.0
% non nativi	30.9	27.2	36.6	37.0	36.1	45.9	33.5	38.3	31.9	34.7	28.4	20.0
% residenti area metropolitana	66.3	66.5	65.7	66.1	60.9	51.2	63.6	60.8	60.6	67.8	66.2	67.5
% residenti fuori area metropolitana	30.3	31.6	33.3	32.2	37.3	44.0	35.8	38.3	38.2	31.2	33.8	31.7
% senza fissa dimora (SFD)	4.5	1.3	0.9	0.9	1.7	4.8	2.3	2.7	2.8	2.5	0.7	2.5
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.8

di cui % cannabis e alcol	18.5	19.6	12.2	15.7	13.3	10.0	14.5	13.1	13.5	20.8	18.2	11.7
di cui % cannabis e oppioidi+coca	0.6	0.0	1.9	0.9	1.3	1.4	1.2	1.4	1.2	4.0	1.4	1.7
di cui % cannabis e coca	23.0	20.9	27.2	27.8	32.6	34.4	27.7	21.2	16.7	18.3	12.2	6.7
di cui % cannabis e oppioidi	5.6	6.3	4.7	7.0	8.6	13.4	8.7	17.6	17.9	14.9	18.2	25.0
di cui % solo cannabis (no opp no coca no alc)	52.2	53.2	54.0	48.7	44.2	40.7	48.0	46.8	50.6	42.1	50.0	55.0

% altre sostanze illegali	3.4	3.8	6.6	6.5	4.3	5.3	6.4	11.7	5.6	5.0	3.4	4.2
% abuso concomitante di psicofarmaci	2.2	4.4	3.3	3.9	3.0	0.0	4.0	3.6	2.8	4.5	6.1	5.0
di cui % benzodiazepine	0.6	3.2	2.8	3.5	1.3	0.0	0.6	0.9	0.8	1.0	3.4	2.5

% anche alcol	23.6	24.7	16.0	17.8	15.0	13.4	16.2	15.3	15.1	24.8	21.6	15.0
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	1.1	0.0	1.4	1.7	5.2	5.3	0.0	4.5	2.0	4.0	4.1	9.2

% Ospedale	12.4	13.9	15.0	15.7	11.6	10.0	15.6	14.4	11.2	8.9	10.8	13.3
% Psichiatria***	-	5.1	5.2	2.6	0.0	5.3	4.0	9.0	6.0	2.0	2.0	1.7
% Pronto soccorso	43.8	39.9	37.6	42.6	38.6	24.4	24.9	27.5	37.8	30.7	31.1	25.8
% SERT	41.6	42.4	46.5	47.0	55.4	65.1	61.3	55.4	54.2	52.0	56.1	63.3
di cui % anche Carcere	6.7	12.7	20.2	15.2	25.3	30.1	26.0	23.9	20.7	22.3	18.2	10.8
di cui % anche Unità Mobile Metadone	1.7	3.8	0.5	0.9	1.3	1.9	1.2	1.4	1.6	1.5	2.0	0.0

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di cannabinoidi

** persone presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 12 - Consumo problematico di benzodiazepine*. Caratteristiche persone. Periodo 2010-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	78	80	166	127	91	150	122	149	127	150	119	117
% nuovi contatti**	19.2	17.5	43.4	44.9	30.8	38.0	37.7	42.3	37.8	17.3	18.5	41.9
età media	45.8	46.8	49.4	49.0	45.7	50.2	49.5	48.7	50.0	43.5	44.1	46.8
% maschi	55.1	65.0	52.4	52.8	64.8	58.7	63.9	52.3	57.5	74.7	68.1	53.8
% femmine	42.3	35.0	47.6	47.2	35.2	41.3	36.1	47.7	42.5	25.3	31.9	46.2
% nativi	82.1	90.0	81.3	85.8	80.2	82.7	82.8	77.2	81.9	86.7	84.9	88.0
% non nativi	16.7	10.0	18.1	13.4	17.6	17.3	17.2	22.8	18.1	13.3	15.1	12.0
% residenti area metropolitana	88.5	88.8	88.0	85.0	75.8	82.7	81.1	84.6	87.4	81.3	79.8	88.0
% residenti fuori area metropolitana	9.0	11.3	10.8	14.2	23.1	16.0	18.0	12.8	11.0	15.3	20.2	11.1
% senza fissa dimora (SFD)	3.8	3.8	4.2	3.1	2.2	2.7	4.9	5.4	3.1	8.7	9.2	6.0
% decesso overdose	0.0	1.3	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.0	0.9
% oppioidi	43.6	30.0	19.9	24.4	31.9	34.7	34.4	27.5	30.7	68.0	65.5	38.5
di cui % oppioidi e cocaina	9.0	7.5	3.6	7.9	3.3	6.0	3.3	2.7	1.6	16.7	11.8	6.8
di cui % oppioidi e alcol (no cocaina)	7.7	3.8	3.6	4.7	3.3	2.7	2.5	3.4	4.7	20.0	13.4	15.4
di cui % solo oppioidi (no cocaina e no alcol)	26.9	18.8	12.7	11.8	25.3	26.0	28.7	21.5	24.4	31.3	40.3	16.2
% cocaina	25.6	23.8	18.1	19.7	27.5	14.7	12.3	10.1	9.4	27.3	23.5	14.5
di cui % cocaina e oppioidi	9.0	7.5	3.6	7.9	3.3	6.0	3.3	2.7	1.6	16.7	11.8	6.8
di cui % cocaina e alcol (no oppioidi)	5.1	2.5	4.8	1.6	5.5	2.7	4.9	2.0	3.1	4.7	4.2	3.4
di cui % solo cocaina (no oppioidi e no alcol)	11.5	13.8	9.6	10.2	18.7	6.0	4.1	5.4	4.7	6.0	7.6	4.3
% cannabinoidi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % cannabis e alcol	0.0	1.3	1.2	2.4	2.2	0.7	1.6	0.0	0.8	2.0	0.0	0.0
di cui % cannabis e oppioidi+coca	0.0	1.3	1.2	0.8	0.0	0.0	0.8	0.7	0.0	4.0	1.7	0.0
di cui % cannabis e coca	2.6	1.3	1.2	2.4	1.1	1.3	0.0	0.7	0.8	2.0	1.7	0.0
di cui % cannabis e oppioidi	2.6	0.0	0.6	0.8	0.0	0.0	0.8	0.7	3.1	4.0	6.7	0.0
di cui % solo cannabis (no opp no coca no alc)	0.0	3.8	3.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	0.7	2.5	0.0
% altre sostanze illegali	11.5	13.8	7.8	13.4	15.4	12.7	9.0	20.8	9.4	31.3	29.4	39.3
% anche alcol	44.9	42.5	44.0	41.7	53.8	38.0	36.9	35.6	33.9	40.7	29.4	47.0
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	20.5	21.3	10.8	9.4	15.4	18.7	16.4	13.4	14.2	32.7	31.9	20.5
% Ospedale	9.0	11.3	30.1	33.1	13.2	30.0	36.1	33.6	39.4	16.0	14.3	42.7
% Psichiatria***	-	6.3	1.8	2.4	4.4	2.7	6.6	4.7	3.1	4.0	2.5	2.6
% Pronto soccorso	33.3	23.8	42.8	44.1	44.0	19.3	27.0	43.6	18.1	37.3	34.5	26.5
% SERT	55.1	52.5	34.3	38.6	46.2	44.7	45.1	38.3	45.7	66.7	62.2	38.5
di cui % anche Carcere	3.8	5.0	2.4	6.3	17.6	13.3	13.1	11.4	11.0	10.0	11.8	13.7
di cui % anche Unità Mobile Metadone	1.3	1.3	1.2	0.8	0.0	2.0	4.1	3.4	1.6	6.0	7.6	0.9

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di benzodiazepine

** persone presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 13 - Consumo problematico di benzodiazepine*. Caratteristiche "nuovi" contatti**. Periodo 2010-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	15	14	72	57	28	57	46	63	48	26	22	49	32
età media	35.3	40.4	51.6	49.7	45.5	57.2	55.7	54.4	57.2	47.6	45.3	54.8	44.3
% maschi	46.7	64.3	43.1	42.1	57.1	45.6	52.2	33.3	37.5	65.4	59.1	28.6	43.8
% femmine	53.3	35.7	56.9	57.9	42.9	54.4	47.8	66.7	62.5	34.6	40.9	71.4	100.0
% nativi	73.3	78.6	76.4	84.2	67.9	78.9	91.3	77.8	77.1	88.5	77.3	89.8	78.1
% non nativi	20.0	21.4	22.2	14.0	25.0	21.1	8.7	22.2	22.9	11.5	22.7	10.2	21.9
% residenti area metropolitana	73.3	85.7	84.7	80.7	53.6	84.2	80.4	87.3	85.4	76.9	63.6	93.9	65.6
% residenti fuori area metropolitana	20.0	14.3	12.5	17.5	42.9	14.0	19.6	11.1	14.6	23.1	36.4	6.1	34.4
% senza fissa dimora (SFD)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
% oppioidi	26.7	0.0	5.6	5.3	14.3	14.0	15.2	1.6	10.4	42.3	36.4	8.2	31.3
di cui % oppioidi e cocaina	0.0	0.0	2.8	1.8	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	11.5	9.1	2.0	6.3
di cui % oppioidi e alcol (no cocaina)	6.7	0.0	1.4	1.8	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	11.5	4.5	4.1	3.1
di cui % solo oppioidi (no cocaina e no alcol)	20.0	0.0	1.4	1.8	14.3	10.5	13.0	1.6	10.4	19.2	22.7	2.0	21.9
% cocaina	33.3	42.9	15.3	14.0	21.4	5.3	4.3	4.8	4.2	26.9	27.3	4.1	9.4
di cui % cocaina e oppioidi	0.0	0.0	2.8	1.8	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	11.5	9.1	2.0	6.3
di cui % cocaina e alcol (no oppioidi)	6.7	14.3	5.6	0.0	3.6	0.0	2.2	1.6	0.0	3.8	4.5	2.0	0.0
di cui % solo cocaina (no oppioidi e no alcol)	26.7	28.6	6.9	12.3	17.9	1.8	2.2	3.2	4.2	11.5	13.6	0.0	3.1
% cannabinoidi	6.7	35.7	8.3	14.0	10.7	0.0	2.2	3.2	4.2	7.7	22.7	6.1	3.1
di cui % cannabis e alcol	0.0	7.1	0.0	3.5	7.1	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % cannabis e oppioidi+coca	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % cannabis e coca	6.7	7.1	2.8	5.3	3.6	0.0	0.0	1.6	2.1	7.7	4.5	0.0	0.0
di cui % cannabis e oppioidi	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	13.6	0.0	0.0
di cui % solo cannabis (no opp no coca no alc)	0.0	21.4	4.2	3.5	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0
% altre sostanze illegali	13.3	7.1	1.4	14.0	7.1	7.0	4.3	15.9	2.1	34.6	36.4	71.4	28.1
% anche alcol	33.3	35.7	33.3	24.6	67.9	33.3	28.3	28.6	12.5	19.2	22.7	30.6	56.3
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	1.8	4.3	0.0	0.0	7.7	4.5	4.1	3.1
% Ospedale	6.7	28.6	51.4	49.1	17.9	49.1	58.7	50.8	70.8	38.5	18.2	77.6	15.6
% Psichiatria***	-	7.1	0.0	1.8	0.0	1.8	2.2	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
% Pronto soccorso	60.0	50.0	40.3	40.4	78.6	14.0	28.3	57.1	6.3	50.0	63.6	28.6	62.5
% SERT	26.7	21.4	12.5	24.6	10.7	14.0	19.6	3.2	20.8	34.6	40.9	10.2	21.9
di cui % anche Carcere	0.0	0.0	1.4	3.5	10.7	5.3	6.5	1.6	10.4	0.0	13.6	2.0	18.8
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	9.1	2.0	0.0

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di benzodiazepine

** persone presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 14 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche utenti in carico al SERT. Periodo 2010-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	2673	2674	2778	2667	2673	2770	2853	2864	2871	2933	3032	3189
% mai stato in precedenza al SERT**	11.3	10.8	15.7	14.8	15.3	15.5	15.6	14.7	13.2	14.3	15.1	16.7
età media	42.6	42.2	41.5	41.2	40.7	40.1	39.6	39.3	38.8	38.1	37.5	36.8
% maschi	81.8	82.2	81.9	81.7	81.7	81.6	82.1	82.4	82.3	81.5	81.8	81.8
% femmine	18.2	17.8	18.1	18.3	18.3	18.4	17.9	17.6	17.7	18.5	18.2	18.2
% nativi	77.9	78.4	78.5	78.6	78.6	78.1	77.6	76.9	78.2	78.8	79.6	80.5
% non nativi	22.0	21.4	21.3	21.3	21.3	21.8	22.4	23.0	21.6	21.2	20.4	19.5
% residenti area metropolitana	79.6	78.4	80.5	78.1	79.0	73.1	74.6	73.5	71.7	70.4	70.1	69.6
% residenti fuori area metropolitana	17.7	18.5	17.0	19.5	17.5	24.6	23.8	24.6	26.4	28.3	29.7	28.5
% senza fissa dimora (SFD)	7.6	7.7	5.9	6.4	6.5	6.2	5.9	6.6	5.7	4.3	4.0	5.9
% decesso overdose	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
% oppioidi	70.1	72.7	71.3	74.9	76.4	78.5	80.8	82.5	82.4	84.4	84.4	84.1
di cui % oppioidi e cocaina	24.6	24.4	20.9	21.3	20.2	16.1	16.7	15.9	13.1	12.0	10.8	11.6
di cui % oppioidi e alcol (no cocaina)	4.9	5.0	4.4	4.5	4.1	3.5	4.9	4.7	5.0	4.8	4.8	4.2
di cui % solo oppioidi (no cocaina e no alcol)	40.6	43.3	46.1	49.0	52.0	58.8	59.1	61.9	64.3	67.6	68.8	68.3
% cocaina	52.1	49.8	46.0	44.5	41.2	34.7	33.4	31.3	28.1	24.6	22.9	24.5
di cui % cocaina e oppioidi	24.6	24.4	20.9	21.3	20.2	16.1	16.7	15.9	13.1	12.0	10.8	11.6
di cui % cocaina e alcol (no oppioidi)	8.6	7.1	6.1	4.9	4.4	4.1	4.1	3.5	3.1	2.2	2.1	2.7
di cui % solo cocaina (no oppioidi e no alcol)	19.0	18.3	19.1	18.3	16.5	14.4	12.6	11.9	11.9	10.4	9.9	10.2
% cannabinoidi	14.6	14.4	14.2	14.1	14.4	15.3	13.0	13.0	12.3	10.5	9.9	9.6
di cui % cannabis e alcol	0.5	0.4	0.4	0.1	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
di cui % cannabis e oppioidi+coca	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % cannabis e coca	5.2	5.1	5.3	5.6	5.2	4.5	3.6	3.2	2.3	1.8	1.1	1.3
di cui % cannabis e oppioidi	4.5	4.8	4.5	4.8	5.3	6.7	5.2	6.1	6.2	5.1	5.2	5.4
di cui % solo cannabis (no opp no coca no alc)	4.2	3.8	4.1	3.5	3.5	3.7	3.3	3.3	3.4	3.2	3.3	2.7
% amfetamine	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.3
% ecstasy	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3
% benzodiazepine	1.3	1.4	1.6	1.4	1.4	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.2
% anche gioco	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0
% anche alcol	10.3	9.1	7.9	6.4	6.8	6.1	7.0	6.3	6.3	5.8	6.1	5.4
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	31.1	32.9	33.2	35.2	36.5	37.6	38.7	40.0	41.1	42.7	44.8	46.1
% Ospedale	2.4	2.8	2.5	4.6	4.0	3.4	2.4	2.6	2.8	3.4	2.8	2.6
% Psichiatria***	-	4.0	3.4	3.4	3.5	3.6	4.5	3.7	2.3	2.2	1.7	1.4
% Pronto soccorso	4.8	4.4	9.7	5.6	4.9	4.2	4.0	7.1	8.4	8.4	6.7	4.5
% anche Carcere	13.2	16.0	16.0	16.6	17.9	18.7	20.9	22.0	21.5	23.5	22.5	20.2
% anche Unità Mobile Metadone	3.5	5.5	5.0	5.7	5.3	5.4	6.0	6.3	4.6	4.8	4.8	6.1

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali

** persone presenti al SERT solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 15 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche "nuovi" utenti** in carico al SERT. Periodo 2010-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	302	290	435	396	408	429	444	422	380	420	459	532
età media	33.8	34.5	34.3	33.3	33.9	32.8	33.1	32.8	32.6	32.4	32.1	31.6
% maschi	79.1	84.8	84.8	86.9	85.8	86.0	86.5	84.1	87.9	85.0	85.2	86.5
% femmine	20.9	15.2	15.2	13.1	14.2	14.0	13.5	15.9	12.1	15.0	14.8	13.5
% nativi	65.9	67.2	66.0	64.4	63.5	56.2	67.8	62.8	66.3	59.3	65.4	63.5
% non nativi	34.1	32.4	33.8	35.6	36.5	43.8	32.2	37.0	33.2	40.7	34.6	36.5
% residenti area metropolitana	65.2	61.7	65.1	58.1	58.6	50.3	57.4	53.3	53.7	43.3	43.8	41.7
% residenti fuori area metropolitana	27.8	32.8	31.0	36.6	37.0	43.1	39.9	42.9	42.9	53.8	55.8	54.5
% senza fissa dimora (SFD)	11.9	9.0	5.7	10.6	7.6	9.6	8.1	12.3	7.9	6.9	2.6	8.3
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0
% oppioidi	36.1	40.3	33.6	42.4	44.4	48.5	56.3	59.2	55.3	65.0	62.5	67.3
di cui % oppioidi e cocaina	14.2	17.9	15.6	19.7	19.6	15.9	20.0	17.1	14.2	8.8	5.4	5.5
di cui % oppioidi e alcol (no cocaina)	1.0	1.7	0.7	1.0	1.0	0.5	0.7	2.8	2.4	3.1	2.4	0.9
di cui % solo oppioidi (no cocaina e no alcol)	20.9	20.7	17.2	21.7	23.8	32.2	35.6	39.3	38.7	53.1	54.7	60.9
% cocaina	57.9	60.0	63.7	62.1	58.8	53.4	50.5	44.8	41.1	30.7	27.2	23.9
di cui % cocaina e oppioidi	14.2	17.9	15.6	19.7	19.6	15.9	20.0	17.1	14.2	8.8	5.4	5.5
di cui % cocaina e alcol (no oppioidi)	7.3	7.9	7.6	2.3	3.7	5.4	4.7	3.6	2.9	1.7	2.2	2.3
di cui % solo cocaina (no oppioidi e no alcol)	36.4	34.1	40.5	40.2	35.5	32.2	25.7	24.2	23.9	20.2	19.6	16.2
% cannabinoidi	26.5	23.4	26.4	28.0	30.9	32.9	24.1	28.2	32.6	21.4	15.3	12.2
di cui % cannabis e alcol	1.7	1.0	1.4	0.5	0.2	0.0	1.1	0.7	2.4	0.7	0.7	0.2
di cui % cannabis e oppioidi+coca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % cannabis e coca	9.6	6.6	11.7	13.6	13.0	15.2	9.7	9.2	8.2	6.2	2.0	0.9
di cui % cannabis e oppioidi	2.6	3.4	1.8	3.3	4.7	6.8	3.4	8.1	10.3	5.2	2.6	3.6
di cui % solo cannabis (no opp no coca no alc)	12.6	12.4	11.5	10.6	13.0	11.0	9.7	10.2	11.8	9.3	10.0	7.5
% amfetamine	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.7	1.4	0.5	0.5	0.4	0.4
% ecstasy	0.3	1.0	0.5	0.5	0.0	0.9	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.2
% benzodiazepine	1.3	0.7	1.6	2.3	1.2	1.4	2.3	0.0	1.8	1.2	1.1	0.8
% anche gioco	0.3	0.3	0.5	0.3	0.0	0.5	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0
% anche alcol	10.6	10.7	9.9	4.0	4.9	6.1	6.8	7.1	8.2	5.5	5.2	3.4
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	8.6	12.8	11.3	13.1	15.2	11.9	17.1	21.6	16.1	25.0	20.3	24.6
% Ospedale	2.0	2.8	3.7	5.3	5.1	3.0	3.8	2.1	2.6	1.4	2.2	1.7
% Psichiatria***	-	3.4	1.8	1.5	1.0	2.6	4.3	5.2	2.6	1.2	1.5	1.1
% Pronto soccorso	7.6	3.8	8.3	6.8	6.4	4.7	5.0	7.8	7.9	6.2	5.0	3.9
% anche Carcere	15.9	23.1	26.0	28.0	32.1	38.5	30.9	30.6	32.9	46.0	43.1	37.6
% anche Unità Mobile Metadone	5.3	9.7	5.7	10.4	8.8	7.9	11.3	14.9	8.4	8.6	5.9	12.0

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali

** persone presenti al SERT solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 16 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche persone dimesse dagli Ospedali. Periodo 2010-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	230	238	314	318	279	285	287	310	242	245	261	326
% nuovi contatti**	52.2	52.9	62.1	46.9	45.5	47.7	55.4	58.1	46.7	39.6	57.5	68.1
età media	39.6	43.5	43.4	43.2	42.5	45.6	45.7	45.0	44.4	45.5	48.4	47.3
% maschi	67.0	71.4	60.8	64.8	66.7	68.8	65.9	66.8	66.9	66.9	62.5	52.1
% femmine	33.0	28.6	39.2	35.2	33.3	31.2	34.1	33.2	33.1	50.6	60.2	47.9
% nativi	75.7	79.4	75.2	78.9	84.2	86.0	82.6	84.8	83.1	99.6	105.4	86.8
% non nativi	23.9	20.6	24.5	20.8	15.1	14.0	17.4	15.2	16.9	18.0	17.2	13.2
% residenti area metropolitana	83.0	87.4	88.2	86.2	86.7	87.0	86.8	90.3	87.2	102.4	104.2	83.4
% residenti fuori area metropolitana	17.0	11.8	11.1	13.5	12.2	12.6	12.9	9.4	12.0	15.1	18.4	16.6
% senza fissa dimora (SFD)	0.9	4.6	2.2	2.8	4.7	1.1	2.8	2.6	2.5	4.1	1.1	2.1
% decesso overdose	0.0	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
% oppioidi	33.5	38.2	28.3	38.1	41.6	38.6	33.4	43.9	48.8	57.6	44.4	31.0
di cui % oppioidi e cocaina	11.3	16.4	10.5	15.7	19.4	12.3	9.4	9.7	14.5	17.6	15.3	7.4
di cui % oppioidi e alcol (no cocaina)	4.8	4.6	3.2	6.3	7.2	5.6	6.6	11.0	6.6	10.6	7.7	8.6
di cui % solo oppioidi (no cocaina e no alcol)	17.4	17.2	14.6	16.0	15.1	20.7	17.4	23.2	27.7	29.4	21.5	15.0
% cocaina	42.6	46.6	31.8	35.5	44.4	30.9	24.7	20.3	24.8	25.7	24.5	14.1
di cui % cocaina e oppioidi	11.3	16.4	10.5	15.7	19.4	12.3	9.4	9.7	14.5	17.6	15.3	7.4
di cui % cocaina e alcol (no oppioidi)	13.0	13.0	8.6	6.9	10.8	8.1	6.3	6.1	4.5	4.1	2.7	3.7
di cui % solo cocaina (no oppioidi e no alcol)	18.3	17.2	12.7	12.9	14.3	10.5	9.1	4.5	5.8	4.1	6.5	3.1
% cannabinoidi	24.3	22.3	23.6	26.4	21.9	21.8	20.2	16.8	23.6	18.8	11.5	8.3
di cui % cannabis e alcol	5.2	2.1	2.9	4.4	4.7	2.5	3.8	2.6	5.0	2.9	2.7	1.8
di cui % cannabis e oppioidi+coca	0.9	1.7	1.9	3.8	2.5	2.8	2.1	1.9	2.1	2.9	1.1	0.6
di cui % cannabis e coca	9.1	7.1	5.7	5.0	5.4	6.7	4.2	1.9	3.7	1.6	1.1	0.9
di cui % cannabis e oppioidi	0.9	1.7	2.2	3.5	2.2	2.5	2.1	0.6	3.3	5.3	3.1	2.1
di cui % solo cannabis (no opp no coca no alc)	8.3	9.7	10.8	9.7	7.2	7.4	8.0	9.7	9.5	6.1	3.4	2.8
% altre sostanze illegali	47.4	45.0	46.5	46.2	49.5	47.4	49.1	45.8	30.6	51.8	59.8	58.3
% abuso concomitante di psicofarmaci	10.0	10.9	22.9	19.8	14.7	25.3	25.8	24.5	28.1	40.4	37.9	50.6
di cui % benzodiazepine	3.0	3.8	15.9	13.2	4.3	15.8	15.3	16.1	20.7	27.3	29.1	15.3
% anche alcol	30.0	27.7	23.9	27.0	33.7	24.9	28.9	30.0	24.4	32.7	24.5	18.4
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	7.8	14.3	8.0	15.4	17.6	18.6	10.5	13.5	19.8	20.4	20.7	15.3
% Psichiatria***	-	10.1	8.3	6.9	8.2	11.6	14.3	9.0	7.4	7.8	5.0	2.5
% Pronto soccorso	17.4	23.1	20.4	22.3	25.8	15.4	15.0	22.9	27.3	27.8	19.9	17.2
% SERT	27.4	31.1	22.3	39.0	38.4	32.6	24.0	23.9	32.6	41.2	32.6	25.5
di cui % anche Carcere	1.3	2.5	1.3	2.5	3.6	3.5	1.4	2.3	0.8	4.9	3.1	4.9
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.4	1.7	1.9	1.9	2.9	1.1	1.4	1.3	1.2	4.1	1.9	0.6

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali

** persone presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 17 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche "nuovi" persone** dimesse dagli Ospedali. Periodo 2010-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	120	126	195	149	127	136	159	180	113	97	150	222
età media	39.1	44.5	46.5	44.7	42.9	50.0	48.7	46.8	48.0	44.8	45.8	51.5
% maschi	62.5	67.5	55.9	59.1	61.4	65.4	62.3	61.7	54.0	53.6	50.0	42.8
% femmine	37.5	32.5	44.1	40.9	38.6	34.6	37.7	38.3	46.0	42.3	50.0	57.2
% nativi	75.0	77.0	75.4	76.5	81.9	85.3	81.1	82.8	84.1	78.4	80.0	87.8
% non nativi	24.2	23.0	24.1	22.8	16.5	14.7	18.9	17.2	15.9	17.5	20.0	12.2
% residenti area metropolitana	76.7	85.7	84.6	79.2	78.7	77.9	80.5	85.6	82.3	81.4	75.3	80.6
% residenti fuori area metropolitana	23.3	13.5	14.4	20.1	19.7	21.3	18.9	13.9	16.8	14.4	24.7	19.4
% senza fissa dimora (SFD)	0.0	0.8	0.0	1.3	1.6	0.0	1.9	0.6	0.0	1.0	0.0	0.5
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% oppioidi	30.0	31.7	24.6	21.5	24.4	23.5	27.0	35.6	30.1	22.7	24.7	12.2
di cui % oppioidi e cocaina	5.8	6.3	4.6	2.7	7.1	2.2	4.4	5.6	5.3	1.0	6.0	1.4
di cui % oppioidi e alcol (no cocaina)	3.3	3.2	2.6	1.3	3.1	2.2	4.4	6.1	1.8	3.1	2.7	0.0
di cui % solo oppioidi (no cocaina e no alcol)	20.8	22.2	17.4	17.4	14.2	19.1	18.2	23.9	23.0	18.6	16.0	10.8
% cocaina	35.0	35.7	19.5	18.8	33.1	16.9	14.5	13.3	10.6	8.2	17.3	8.1
di cui % cocaina e oppioidi	5.8	6.3	4.6	2.7	7.1	2.2	4.4	5.6	5.3	1.0	6.0	1.4
di cui % cocaina e alcol (no oppioidi)	10.0	11.1	4.1	4.7	7.9	1.5	3.8	2.8	0.9	3.1	2.0	2.3
di cui % solo cocaina (no oppioidi e no alcol)	19.2	18.3	10.8	11.4	18.1	13.2	6.3	5.0	4.4	4.1	9.3	4.5
% cannabinoidi	18.3	17.5	16.4	24.2	21.3	15.4	17.0	17.8	24.8	18.6	10.7	7.2
di cui % cannabis e alcol	4.2	3.2	0.5	3.4	4.7	3.7	3.1	2.2	2.7	4.1	2.0	0.9
di cui % cannabis e oppioidi+coca	0.0	0.0	1.5	0.0	0.8	0.0	1.3	1.7	1.8	0.0	0.7	0.0
di cui % cannabis e coca	5.0	4.0	2.6	4.7	3.1	4.4	3.1	1.7	0.9	2.1	1.3	1.4
di cui % cannabis e oppioidi	0.0	0.8	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.3	1.8
di cui % solo cannabis (no opp no coca no alc)	9.2	9.5	10.8	14.1	12.6	7.4	9.4	12.2	17.7	12.4	5.3	3.2
% altre sostanze illegali	43.3	38.9	40.0	38.3	46.5	41.2	39.6	40.0	22.1	55.7	64.7	77.9
% abuso concomitante di psicofarmaci	7.5	7.1	25.1	24.2	15.0	26.5	25.8	24.4	37.2	20.6	10.7	59.5
di cui % benzodiazepine	0.8	3.2	19.0	18.8	3.9	20.6	17.0	17.8	30.1	10.3	2.7	17.1
% anche alcol	22.5	19.8	12.8	12.1	20.5	13.2	17.6	17.2	9.7	21.6	13.3	12.6
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	0.8	1.6	1.5	1.3	3.1	0.0	1.3	0.6	0.9	1.0	2.7	0.9
% Psichiatria***	-	4.0	2.1	5.4	0.0	3.7	3.1	4.4	6.2	2.1	0.7	0.9
% Pronto soccorso	10.0	11.9	8.2	15.4	18.1	5.9	5.7	13.9	17.7	20.6	8.7	14.0
% SERT	5.8	4.0	5.6	10.1	12.6	3.7	5.7	2.2	5.3	4.1	6.7	5.0
di cui % anche Carcere	0.8	0.0	0.5	0.0	1.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	0.5	0.7	2.4	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	2.0	0.0

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali

** persone presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 18 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche persone incluse. Periodo 2010-2021

	2021	2018	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	2533	2622	2902	2799	2723	2671	2827	3354	2901	3087	2837	2976
% nuovi contatti**	38.9	36.0	40.4	40.9	40.4	40.0	40.6	49.9	47.7	48.6	50.2	42.4
età media	50.2	50.3	49.5	49.6	49.1	49.0	49.0	47.8	47.1	47.6	47.3	46.7
% maschi	74.3	73.1	73.1	73.4	73.5	72.7	74.0	73.0	74.6	74.6	75.4	75.0
% femmine	25.7	26.9	26.9	26.6	26.5	27.3	26.0	27.0	25.4	25.4	24.6	25.0
% nativi	73.2	75.1	74.7	74.4	73.8	75.6	77.0	72.6	75.2	74.7	77.9	79.4
% non nativi	26.4	24.7	24.5	24.8	25.0	23.5	22.7	24.8	24.6	25.3	22.0	20.6
% residenti area metropolitana	84.1	85.0	83.5	82.4	82.2	82.3	84.1	79.9	80.4	79.9	81.7	82.1
% residenti fuori area metropolitana	13.8	13.6	14.6	16.6	15.4	15.2	14.8	19.2	17.2	19.7	18.3	16.3
% senza fissa dimora (SFD)	3.3	2.9	2.3	2.5	2.5	2.1	2.1	2.3	2.5	2.0	1.8	4.3
% decesso overdose	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0

% solo alcol	74.3	76.8	78.9	80.1	80.5	79.1	81.2	83.3	82.4	70.8	71.1	67.4
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

% abuso concomitante di sostanze illegali	25.7	23.2	21.1	19.9	19.5	20.9	18.8	16.7	17.6	29.2	28.9	32.6
di cui % eroina e cocaina	1.4	1.1	0.9	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.6	4.3	4.1	4.8
di cui % eroina (no cocaina)	5.9	6.0	5.3	5.7	5.4	6.0	6.7	6.5	6.5	13.0	15.3	16.9
di cui % cocaina (no eroina)	11.4	9.6	8.6	6.5	6.5	6.3	5.7	4.3	4.4	3.6	3.1	5.1
di cui % cannabis (no eroina, no cocaina)	3.8	3.1	2.5	2.8	2.7	2.5	2.3	2.0	2.1	2.2	1.6	1.8

% abuso concomitante di sostanze illegali	25.7	23.2	21.1	19.9	19.5	20.9	18.8	16.7	17.6	29.2	28.9	32.6
di cui % oppioidi	7.3	7.1	6.2	6.9	6.5	7.0	7.7	7.3	7.0	17.3	19.4	21.7
di cui % cocaina	12.8	10.7	9.5	7.7	7.6	7.3	6.7	5.2	5.0	7.8	7.2	9.9
di cui % cannabinoidi	4.9	3.9	3.3	3.6	3.3	3.6	2.8	2.7	2.6	4.1	2.8	3.3
di cui % altre sostanze illegali	3.8	4.2	3.5	4.6	4.6	5.5	3.6	4.7	4.2	7.4	6.1	4.8

% abuso concomitante di psicofarmaci	2.2	3.8	5.1	4.5	4.5	5.0	6.4	4.6	3.7	8.7	6.6	5.2
--------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

% Ospedale	22.4	20.4	19.6	20.6	22.0	22.9	21.5	21.9	22.0	21.2	22.7	22.7
% Psichiatria***	-	10.9	7.9	8.0	8.2	8.4	14.6	12.2	6.7	6.0	6.3	5.2
% Pronto Soccorso	42.2	38.9	45.8	48.4	44.8	44.8	41.1	50.0	51.4	49.2	44.4	26.6
% SERT	48.0	46.4	44.0	43.9	43.5	43.7	44.2	36.3	41.5	36.2	40.0	42.1
di cui % anche Carcere	3.3	3.7	3.1	2.5	3.0	3.1	3.7	2.2	2.0	2.2	2.5	4.1
di cui % anche Unità Mobile Metadone	1.4	0.9	0.8	1.1	0.8	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	0.9	1.9

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol

** persone presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 19 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche "nuovi" contatti**. Periodo 2010-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	986	944	1171	1144	1101	1069	1147	1672	1384	1500	1424	1262
età media	47.6	47.4	46.0	46.5	46.3	46.1	46.6	45.3	44.0	45.6	45.5	46.4
% maschi	72.9	72.0	73.4	73.1	72.3	67.1	75.0	71.9	73.6	73.7	74.8	73.5
% femmine	27.1	28.0	26.6	26.9	27.7	31.2	25.0	28.1	26.5	26.6	25.2	26.4
% nativi	67.7	68.6	67.4	65.8	66.6	67.1	71.4	65.1	67.5	65.5	71.0	71.0
% non nativi	31.4	30.9	30.9	32.6	31.2	31.2	28.2	31.1	33.4	33.7	31.5	33.5
% residenti area metropolitana	75.9	75.2	72.1	70.7	70.6	70.7	74.6	70.8	70.1	70.7	71.6	71.4
% residenti fuori area metropolitana	21.2	23.0	25.1	28.0	26.2	25.7	24.1	28.6	25.8	29.2	28.3	26.7
% senza fissa dimora (SFD)	1.7	0.7	0.3	0.6	0.9	0.9	1.0	0.7	1.1	0.6	0.2	2.7
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
% solo alcol	86.1	85.8	86.4	88.5	88.1	87.1	89.4	90.6	89.7	86.3	86.2	86.8
% abuso concomitante di sostanze illegali	13.9	14.2	13.6	11.5	11.9	12.9	10.6	9.4	10.3	13.7	13.8	13.2
di cui % eroina e cocaina	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.8	1.4	1.9
di cui % eroina (no cocaina)	1.2	1.3	0.9	0.5	1.1	1.0	1.9	2.1	0.9	0.6	3.3	2.9
di cui % cocaina (no eroina)	6.1	6.6	6.3	4.7	4.3	3.4	3.2	2.3	3.0	1.1	2.0	2.8
di cui % cannabis (no eroina, no cocaina)	3.3	3.3	2.2	3.1	2.8	2.0	2.2	1.7	2.5	2.8	1.9	1.1
% abuso concomitante di sostanze illegali	13.9	14.2	13.6	11.5	11.9	12.9	10.6	9.4	10.3	13.7	13.8	13.2
di cui % oppioidi	1.4	1.5	1.1	1.0	1.3	1.3	2.1	2.3	0.9	3.1	4.7	4.8
di cui % cocaina	6.3	6.8	6.5	5.2	4.5	3.6	3.4	2.5	3.1	2.8	3.4	4.7
di cui % cannabinoidi	4.3	4.1	2.9	3.6	3.2	2.6	2.4	2.0	2.7	3.3	2.2	1.4
di cui % altre sostanze illegali	3.3	3.5	2.5	2.7	3.0	5.1	2.9	3.6	3.6	5.1	5.5	4.4
% abuso concomitante di psicofarmaci	1.2	4.4	4.7	3.8	5.5	4.0	6.4	4.3	2.3	5.3	4.8	4.8
% Ospedale	30.0	30.1	22.5	21.3	26.2	25.0	26.8	25.7	20.7	21.6	26.7	33.3
% Psichiatria***	-	2.5	2.1	2.4	0.2	2.9	3.7	7.4	3.0	3.3	3.6	3.4
% Pronto Soccorso	57.7	58.4	64.4	67.7	64.5	64.2	60.9	69.2	71.7	73.9	68.0	55.9
% SERT	18.3	15.8	18.7	17.8	20.2	15.8	16.8	13.3	15.8	13.3	14.3	17.4
di cui % anche Carcere	1.1	2.1	3.5	1.2	2.2	2.7	2.3	0.9	1.2	0.7	1.1	0.9
di cui % anche Unità Mobile Metadone	1.1	0.5	0.0	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.9

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol

** persone presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 20 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche persone non native Periodo 2010-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	668	648	711	694	680	627	643	832	713	781	625	612
% nuovi contatti**	46.4	45.1	50.9	53.7	50.4	53.3	50.2	53.2	45.6	46.1	46.1	32.1
età media	42.2	41.3	41.3	41.4	40.6	39.8	40.6	39.6	39.4	39.2	39.2	38.2
% maschi	75.6	74.8	73.6	73.9	72.9	72.4	71.7	72.8	73.2	73.2	74.2	76.6
% femmine	24.4	25.2	26.4	26.1	27.1	27.6	28.3	27.2	26.8	26.8	25.8	23.4
% residenti area metropolitana	67.2	66.7	62.7	61.8	61.6	60.9	62.2	60.2	58.3	58.3	61.3	60.9
% residenti fuori area metropolitana	27.7	30.1	34.0	35.9	34.4	33.3	35.1	37.7	33.7	41.1	38.7	35.3
% senza fissa dimora (SFD)	6.7	4.5	4.4	4.0	3.4	4.1	3.3	3.4	4.5	3.2	3.7	6.5
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
% solo alcol	74.9	77.9	80.3	82.6	83.2	81.2	84.3	87.1	86.5	79.4	81.8	76.5
% abuso concomitante di sostanze illegali	25.1	22.1	19.7	17.4	16.8	18.8	15.7	12.9	13.5	20.6	18.2	23.5
di cui % eroina e cocaina	1.0	0.9	1.1	0.7	1.2	0.5	0.5	0.4	0.3	3.2	2.4	2.6
di cui % eroina (no cocaina)	3.7	3.4	3.7	3.3	3.1	3.8	4.4	3.6	3.4	6.0	7.8	10.5
di cui % cocaina (no eroina)	10.9	10.3	8.2	6.6	5.9	6.4	6.1	3.8	2.8	2.2	1.6	3.9
di cui % cannabis (no eroina, no cocaina)	5.5	4.5	3.8	3.5	3.1	1.9	2.6	2.3	3.2	2.9	1.3	1.1
% abuso concomitante di sostanze illegali	25.1	22.1	19.7	17.4	16.8	18.8	15.7	12.9	13.5	20.6	18.2	23.5
di cui % oppioidi	4.8	4.3	4.8	4.0	4.3	4.3	4.8	4.0	3.6	9.2	10.2	13.1
di cui % cocaina	12.0	11.3	9.3	7.3	7.1	6.9	6.5	4.2	3.1	5.4	4.0	6.5
di cui % cannabinoidi	7.0	5.2	4.8	4.2	3.5	3.7	3.0	3.0	3.6	4.4	1.8	1.5
di cui % altre sostanze illegali	4.9	4.5	3.4	4.5	5.1	5.6	2.6	3.7	3.6	7.0	5.9	5.6
% abuso concomitante di psicofarmaci	1.8	3.1	5.5	3.2	4.6	4.5	5.4	3.8	3.5	5.6	4.2	3.4
% Ospedale	17.7	17.0	15.3	17.1	17.6	18.3	17.0	16.3	13.7	13.6	15.8	15.7
% Psichiatria***	-	6.6	4.4	5.5	4.6	4.9	7.9	7.1	2.9	3.8	4.2	2.5
% Pronto Soccorso	51.8	50.2	57.7	61.1	59.9	60.4	54.9	66.0	68.9	70.3	62.6	50.8
% SERT	43.4	40.6	38.5	37.9	35.9	33.8	37.6	27.6	31.4	24.2	29.0	30.7
di cui % anche Carcere	7.6	7.9	6.6	5.8	6.9	8.0	8.7	4.8	4.5	3.7	4.2	8.2
di cui % anche Unità Mobile Metadone	3.4	1.7	2.4	2.9	2.1	1.9	2.2	1.8	2.1	1.8	2.2	3.4
Area provenienza												
% Europa Est	42.8	44.6	43.9	43.7	45.6	45.6	43.1	45.3	40.7	36.4	39.2	35.3
% Altri paesi europei	5.4	7.6	8.3	8.4	8.1	6.4	8.4	7.2	8.1	8.5	8.2	11.8
% Africa Mediterranea	23.8	23.3	24.3	22.2	22.2	26.8	25.3	25.5	25.8	23.6	25.1	30.4
% Altra Africa	10.0	9.0	8.2	7.9	6.3	6.1	7.0	6.1	5.9	6.1	8.5	7.0
% Asia	11.1	8.0	8.6	9.4	9.1	8.3	10.6	9.7	8.3	10.2	9.4	8.5
% America Latina	6.4	6.3	5.9	7.3	7.6	5.6	4.8	5.0	4.8	6.4	5.9	5.9
% USA e Canada	0.3	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	0.4	0.8	1.0
% Altro	0.1	0.5	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.1	5.5	8.5	2.9	0.2
Nazione												
% Marocco	16.8	17.3	17.4	17.6	15.0	19.3	18.4	18.6	19.1	17.7	18.4	20.8
% Romania	15.7	13.7	17.3	14.1	17.1	17.9	16.6	20.4	16.8	15.1	13.3	12.4
% Tunisia	5.7	4.8	5.5	3.5	5.4	5.6	4.8	4.6	4.3	4.4	4.5	5.4
% Polonia	5.4	6.9	6.5	7.3	5.9	6.1	7.2	6.4	5.9	7.2	7.7	6.7
% Ucraina	4.5	5.7	5.8	6.1	5.9	5.6	4.5	4.2	4.3	3.2	4.5	5.6

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

** persone presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 21 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche "nuovi" contatti** di persone non native. Periodo 2010-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	310	292	362	373	343	334	323	504	446	516	412	365
età media	39.6	39.1	38.3	39.3	38.5	37.5	37.7	37.9	37.5	37.7	37.4	36.4
% maschi	73.2	77.4	75.1	75.3	72.6	75.4	75.9	74.8	74.2	74.2	74.0	76.7
% femmine	26.8	22.6	24.9	24.7	27.4	24.6	24.1	25.2	25.8	25.8	26.0	23.3
% residenti area metropolitana	61.0	58.9	53.0	53.1	52.5	54.2	52.9	52.8	52.0	51.4	57.0	56.7
% residenti fuori area metropolitana	34.5	38.4	44.8	44.8	44.6	41.3	45.8	46.2	37.4	48.4	43.0	38.9
% senza fissa dimora (SFD)	3.9	1.0	0.6	1.1	1.2	1.8	0.9	0.8	1.3	1.4	1.2	5.5
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
% solo alcol	82.3	83.2	85.1	87.1	88.0	85.9	89.8	92.3	90.4	87.0	89.3	89.0
% abuso concomitante di sostanze illegali	17.7	16.8	14.9	12.9	12.0	14.1	10.2	7.7	9.6	13.0	10.7	11.0
di cui % eroina e cocaina	1.3	0.3	0.6	0.5	0.3	0.6	2.2	1.4	1.6	0.6	0.7	1.4
di cui % eroina (no cocaina)	0.0	1.4	1.4	0.8	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	2.1	2.7	2.7
di cui % cocaina (no eroina)	7.1	7.5	5.8	5.9	4.4	5.1	2.5	2.6	2.2	1.7	1.5	0.8
di cui % cannabis (no eroina, no cocaina)	5.8	4.1	4.1	3.5	3.5	1.5	3.1	1.2	2.7	3.1	1.0	0.3
% abuso concomitante di sostanze illegali	17.7	16.8	14.9	12.9	12.0	14.1	10.2	7.7	9.6	13.0	10.7	11.0
di cui % oppioidi	1.3	1.7	1.9	1.3	1.2	1.5	2.2	1.4	1.6	2.7	3.4	4.1
di cui % cocaina	7.1	7.9	6.4	6.4	4.7	5.7	2.5	2.6	2.2	2.3	2.2	2.2
di cui % cannabinoidi	7.1	4.5	4.4	4.3	3.5	3.0	3.4	1.6	2.9	3.9	1.0	0.5
di cui % altre sostanze illegali	4.2	4.1	2.2	3.5	2.9	4.8	2.8	3.2	2.7	5.2	5.3	5.8
% abuso concomitante di psicofarmaci	1.3	4.5	5.0	2.4	4.7	3.0	4.6	3.0	2.2	3.7	3.4	2.5
% Ospedale	21.3	24.3	15.2	16.4	16.3	16.2	17.3	15.5	10.5	11.8	16.3	18.6
% Psichiatria***	-	3.1	1.1	1.9	0.0	2.1	1.2	3.8	0.7	1.9	2.9	0.8
% Pronto Soccorso	61.9	64.0	70.7	74.5	72.3	73.7	70.0	74.8	81.2	83.9	76.9	72.1
% SERT	21.6	15.4	19.9	17.7	16.3	15.6	15.8	11.9	14.3	9.5	12.1	13.7
di cui % anche Carcere	3.2	3.8	7.7	2.9	4.1	7.2	5.3	2.4	3.1	1.4	1.7	3.8
di cui % anche Unità Mobile Metadone	2.6	0.7	0.0	1.1	0.6	0.6	0.9	0.4	0.7	0.6	1.0	0.8
Area provenienza												
% Europa Est	48.1	44.2	45.0	43.2	43.1	43.4	44.6	45.8	43.0	37.6	41.0	36.4
% Altri paesi europei	2.9	6.2	7.7	7.2	7.6	5.1	7.1	6.2	6.5	7.6	7.5	8.5
% Africa Mediterranea	19.4	22.3	22.7	20.9	19.0	27.2	22.3	25.6	24.0	19.8	22.6	32.3
% Altra Africa	9.4	9.2	9.1	7.8	8.5	6.0	6.5	5.8	4.7	6.2	9.0	6.8
% Asia	13.2	9.6	9.9	11.0	11.7	10.5	13.9	10.5	8.3	10.9	9.5	9.9
% America Latina	7.1	6.8	4.4	8.0	9.0	5.7	4.6	4.8	3.8	6.0	5.6	5.2
% USA e Canada	0.0	0.7	1.1	1.6	1.2	1.5	0.9	1.2	1.3	0.4	0.5	0.5
% Altro	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	0.6	0.0	0.2	8.3	11.6	4.4	0.3
Nazione												
% Marocco	13.9	17.8	14.9	18.0	12.8	20.1	17.0	18.7	17.5	15.1	17.5	24.9
% Romaniaa	19.0	14.0	20.2	13.9	17.2	17.7	18.3	22.4	18.4	17.4	14.1	14.5
% Tunisia	4.8	3.4	6.4	2.9	5.2	6.6	4.6	5.2	4.7	4.1	4.4	5.5
% Polonia	3.5	5.1	3.6	7.0	5.2	3.6	5.9	5.0	4.7	6.6	7.0	6.3
% Ucraina	5.2	4.5	4.7	6.2	5.2	4.8	5.3	3.8	4.3	2.3	4.1	5.5

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol

** persone presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 22 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche persone minorenni. Periodo 2010-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	41	30	28	29	33	24	51	44	40	26	37	34
% nuovi contatti**	100.0	100.0	92.9	96.6	100.0	91.7	96.1	100.0	97.5	100.0	100.0	97.1
età media	15.5	15.5	16.2	16.0	15.7	16.0	16.0	15.8	16.0	16.2	16.0	16.0
% maschi	43.9	60.0	42.9	55.2	54.5	58.3	64.7	61.4	65.0	57.7	70.3	64.7
% femmine	56.1	40.0	57.1	44.8	45.5	41.7	35.3	38.6	35.0	42.3	29.7	35.3
% nativi	82.9	96.7	82.1	86.2	78.8	87.5	74.5	90.9	80.0	80.8	83.8	70.6
% non nativi	17.1	3.3	17.9	13.8	21.2	12.5	25.5	9.1	20.0	19.2	16.2	29.4
% residenti area metropolitana	85.4	96.7	85.7	100.0	81.8	91.7	88.2	88.6	87.5	96.2	86.5	91.2
% residenti fuori area metropolitana	14.6	3.3	14.3	0.0	15.2	8.3	11.8	11.4	12.5	3.8	13.5	8.8
% senza fissa dimora (SFD)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% solo alcol	82.9	90.0	85.7	79.3	81.8	79.2	88.2	88.6	90.0	80.8	83.8	97.1
% abuso concomitante di sostanze illegali	17.1	10.0	14.3	20.7	18.2	20.8	11.8	11.4	10.0	19.2	16.2	2.9
di cui % oppioidi	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
di cui % cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % cannabinoidi	12.2	10.0	10.7	13.8	18.2	8.3	3.9	6.8	5.0	7.7	13.5	0.0
di cui % altre sostanze illegali	0.0	0.0	3.6	6.9	0.0	12.5	7.8	9.1	5.0	11.5	2.7	2.9
% abuso concomitante di psicofarmaci	4.9	0.0	0.0	10.3	3.0	0.0	3.9	11.4	0.0	3.8	2.7	5.9
% Ospedale	12.2	0.0	7.1	3.4	9.1	12.5	5.9	4.5	10.0	11.5	5.4	17.6
% Psichiatria***	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% Pronto Soccorso	90.2	100.0	89.3	96.6	90.9	91.7	94.1	97.7	95.0	92.3	91.9	82.4
% SERT	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	8.3	2.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.9
di cui % anche Carcere Minorile	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-
di cui % anche Carcere	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

** persone presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 23 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche utenti in carico al SERT. Periodo 2010-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	1217	1216	1276	1229	1184	1167	1249	1216	1204	1116	1135	1252
% mai stato in precedenza al SERT**	17.8	14.8	21.2	20.7	18.9	17.9	21.1	21.0	22.2	20.3	18.4	17.3
età media	48.7	48.9	48.8	49.1	48.8	48.8	48.3	48.2	47.8	48.2	47.9	47.9
% maschi	73.7	73.9	73.2	72.6	72.6	71.1	74.3	72.9	73.4	74.6	74.8	73.8
% femmine	26.3	26.1	26.8	27.4	27.4	28.9	25.7	27.1	26.6	25.4	25.2	26.2
% nativi	76.0	78.4	78.5	78.5	79.3	81.7	80.6	80.8	81.3	83.1	84.1	85.0
% non nativi	23.8	21.6	21.5	21.4	20.6	18.2	19.4	18.9	18.6	16.9	15.9	15.0
% residenti area metropolitana	88.8	88.9	92.1	91.1	91.3	90.1	90.6	91.6	90.1	90.0	90.3	90.6
% residenti fuori area metropolitana	9.2	9.9	7.2	8.0	7.5	9.1	8.4	7.7	9.1	9.7	9.7	9.1
% senza fissa dimora (SFD)	6.7	6.0	4.6	5.0	5.3	4.5	4.5	5.4	5.2	4.0	3.4	3.5
% decesso overdose	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0
% alcol primaria	77.7	78.7	79.3	84.1	82.3	82.9	83.8	85.0	84.6	84.4	82.8	85.1
% alcol secondaria	23.3	20.5	17.6	14.6	16.0	14.4	15.9	15.0	15.3	15.4	16.4	13.9
% solo alcol	60.4	63.7	69.4	70.6	72.7	73.4	74.5	75.5	75.2	61.6	73.9	70.3
% abuso concomitante di sostanze illegali	39.6	36.3	30.6	29.4	27.3	26.6	25.5	24.5	24.8	38.4	26.1	29.7
di cui % eroina e cocaina	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.2	0.0	0.0	1.6	0.0
di cui % eroina (no cocaina)	10.8	11.0	9.5	9.8	9.3	8.4	11.2	11.1	11.9	12.6	12.9	10.6
di cui % cocaina (no eroina)	18.8	15.6	13.2	10.6	10.0	9.7	9.4	8.1	7.3	5.8	5.7	6.8
di cui % cannabis (no eroina, no cocaina)	5.6	4.2	3.7	3.0	2.9	3.0	3.0	2.6	3.0	2.5	1.9	2.1
% abuso concomitante di sostanze illegali	39.6	36.3	30.6	29.4	27.3	26.6	25.5	24.5	24.8	38.4	26.1	29.7
di cui % eroina	10.8	10.7	9.0	9.4	9.0	9.4	10.9	10.8	11.6	12.5	13.0	11.3
di cui % cocaina	18.7	15.6	13.0	10.6	10.0	10.7	9.4	8.3	7.3	5.8	6.0	6.8
di cui % cannabinoidi	5.8	4.3	3.7	3.0	2.9	3.3	3.1	2.6	3.0	2.5	1.9	2.1
di cui % GHB	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0
di cui % crack	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % amfetamine	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
di cui % ketamina	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
di cui % ecstasy	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% benzodiazepine	1.8	2.2	1.8	1.3	0.8	1.0	1.2	1.1	1.2	1.1	1.3	1.2
% tramadolo	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
% codeina	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
% ossicodone	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
% anche gioco	1.7	1.2	1.1	0.9	1.1	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.0	0.5
% Ospedale	6.7	5.4	7.2	9.8	10.1	9.9	10.2	11.2	11.6	11.3	9.9	9.5
% Psichiatria***	-	10.7	7.6	8.3	8.5	9.0	14.7	14.6	7.6	7.6	6.4	5.2
% Pronto soccorso	12.1	10.3	13.8	16.8	13.2	13.6	12.4	15.0	15.5	15.7	13.5	7.2
% anche Carcere	6.6	7.7	6.3	5.5	6.6	6.3	7.8	5.1	4.0	3.3	4.5	4.2
% anche Unità Mobile Metadone	2.8	1.6	1.3	2.1	1.4	1.0	1.2	1.5	1.7	1.7	1.6	0.7

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

** persone presenti al SERT solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 24 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche "nuovi" utenti** in carico al SERT. Periodo 2010-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	217	180	270	254	224	209	264	255	267	227	209	217
età media	45.3	45.1	44.2	45.9	44.8	44.8	44.2	44.6	43.8	45.4	44.6	43.6
% maschi	70.5	70.6	74.8	71.3	73.7	67.5	73.1	71.0	68.5	74.0	70.8	78.3
% femmine	29.5	29.4	25.2	28.7	26.3	32.5	26.9	29.0	31.5	26.0	29.2	21.7
% nativi	61.8	65.6	68.1	67.3	67.4	71.3	75.8	72.2	70.0	76.7	75.6	74.2
% non nativi	38.2	34.4	31.9	32.7	32.6	28.7	24.2	27.5	30.0	23.3	24.4	25.8
% residenti area metropolitana	85.3	80.0	85.2	86.2	83.5	83.7	84.5	90.6	85.4	85.5	87.6	78.8
% residenti fuori area metropolitana	11.5	17.2	14.1	12.6	15.2	14.8	14.4	9.0	12.7	14.1	12.4	19.8
% senza fissa dimora (SFD)	8.3	5.6	2.6	3.1	5.8	5.7	4.2	4.7	8.6	5.3	3.8	6.0
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% alcol primaria	85.3	79.4	79.3	90.9	85.7	86.1	88.3	87.8	88.0	89.9	88.5	88.9
% alcol secondaria	14.7	17.2	15.6	6.3	9.8	13.4	11.0	11.8	11.6	10.1	11.5	8.3
% solo alcol	69.6	65.6	71.5	75.6	81.3	76.6	82.6	84.3	76.8	72.2	79.4	77.0
% abuso concomitante di sostanze illegali	30.4	34.4	28.5	24.4	18.8	23.4	17.4	15.7	23.2	27.8	20.6	23.0
di cui % eroina e cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
di cui % eroina (no cocaina)	1.4	2.2	0.7	1.6	1.8	2.4	2.7	4.3	3.0	5.3	5.7	2.8
di cui % cocaina (no eroina)	17.5	18.3	1.5	11.4	10.3	9.6	8.3	8.2	7.9	7.0	6.7	8.3
di cui % cannabis (no eroina, no cocaina)	6.5	6.7	5.2	3.9	2.7	1.9	3.0	2.4	6.4	4.4	2.9	2.8
% abuso concomitante di sostanze illegali	30.4	34.4	28.5	24.4	18.8	23.4	17.4	15.7	23.2	27.8	20.6	23.0
di cui % eroina	1.4	2.8	1.5	2.0	1.3	1.4	2.3	4.3	3.4	6.2	5.3	5.5
di cui % cocaina	17.1	20.6	17.0	11.4	10.7	12.9	11.7	9.4	9.4	7.9	7.7	7.8
di cui % cannabinoidi	6.5	6.7	5.9	4.7	3.1	2.9	5.3	3.1	6.7	4.8	3.3	3.2
di cui % GHB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % crack	0.5	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % amfetamine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % ketamina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % ecstasy	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% benzodiazepine	1.4	1.7	1.5	0.0	0.0	0.5	0.8	1.2	1.1	0.9	0.5	0.9
% tramadolo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% codeina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% ossicodone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% anche gioco	1.4	0.6	0.0	0.4	1.8	0.5	1.1	1.2	0.7	0.4	0.0	0.0
% Ospedale	10.1	7.8	7.8	12.6	12.1	12.4	11.7	12.5	15.0	16.3	15.3	11.1
% Psichiatria***	-	8.9	5.2	6.7	1.3	6.2	11.0	13.7	6.7	10.6	5.3	6.9
% Pronto soccorso	12.4	11.7	12.6	19.3	13.4	18.2	13.6	17.6	19.5	20.7	17.7	9.2
% anche Carcere	5.1	6.7	14.1	6.7	11.2	12.0	13.3	6.7	6.4	3.5	4.3	9.7
% anche Unità Mobile Metadone	5.1	3.9	0.4	2.4	3.6	1.4	1.1	1.6	1.5	1.8	2.4	2.8

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

** persone presenti al SERT solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 25 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche persone dimesse dagli Ospedali. Periodo 2010-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	567	535	569	577	600	611	608	736	637	654	644	676
% nuovi contatti**	52.2	53.1	46.4	42.3	48.2	43.7	50.5	52.4	46.3	48.6	60.7	65.5
età media	57.6	57.3	55.9	56.3	56.4	56.8	56.9	55.7	55.5	55.7	56.7	56.1
% maschi	75.3	72.3	73.5	71.4	72.7	74.5	78.0	75.8	76.9	75.8	77.2	77.1
% femmine	24.7	27.7	26.5	28.6	27.3	25.5	22.0	24.2	23.1	24.2	22.8	22.9
% nativi	79.2	79.3	80.8	79.4	79.5	80.7	81.9	81.3	84.0	83.8	84.6	85.8
% non nativi	20.8	20.6	19.2	20.6	20.0	18.8	17.9	18.5	15.4	16.2	15.4	14.2
% residenti area metropolitana	92.2	91.0	91.7	91.7	90.8	90.2	91.4	90.8	89.3	87.9	89.8	90.7
% residenti fuori area metropolitana	7.8	8.4	7.9	8.1	8.7	8.8	8.4	9.0	10.5	12.1	10.2	8.6
% senza fissa dimora (SFD)	1.6	0.9	1.9	2.8	1.2	1.3	2.1	2.2	2.0	1.7	1.1	2.2
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
% solo alcol	84.7	85.0	83.7	81.5	82.5	84.3	85.2	85.3	87.3	78.3	80.0	85.4
% abuso concomitante di sostanze illegali	15.3	15.0	16.3	18.5	17.5	15.7	14.8	14.7	12.7	21.7	20.0	14.6
di cui % eroina e cocaina	1.4	1.5	1.8	1.7	1.8	1.3	0.8	1.6	0.9	2.4	2.0	1.3
di cui % eroina (no cocaina)	2.5	3.7	3.5	4.5	4.8	3.8	5.1	6.7	2.8	9.0	9.8	4.9
di cui % cocaina (no eroina)	5.6	4.7	5.3	3.8	4.0	3.4	3.0	2.0	2.2	2.0	1.2	1.9
di cui % cannabis (no eroina, no cocaina)	3.0	1.3	1.8	2.4	2.7	2.0	1.6	0.7	1.6	1.2	0.8	0.9
di cui % altre sostanze illegali	5.5	5.8	5.6	7.5	6.7	5.9	6.3	6.3	4.7	7.3	7.0	6.5
% abuso concomitante di psicofarmaci	3.4	3.9	6.2	7.3	7.2	6.9	6.1	6.3	6.0	10.1	6.7	6.7
% Pronto soccorso	24.7	22.6	29.2	36.9	29.8	28.8	26.2	29.9	34.4	34.1	30.0	18.8
% Psichiatria***	-	4.5	3.5	6.2	4.2	6.1	9.9	7.9	4.4	6.9	5.0	4.1
% SERT	14.3	12.3	16.2	21.0	20.0	18.8	21.1	18.5	22.0	19.3	17.4	17.6
di cui % anche Carcere	0.2	0.0	0.9	0.3	0.7	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	0.8	0.4
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.2	0.4	0.9	1.2	0.5	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.0

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

** persone presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 26 - Consumo problematico di alcol*. Caratteristiche "nuovi" contatti** di persone dimesse dagli Ospedali. Periodo 2010-2021

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Totale	296	284	264	244	289	267	307	386	295	318	391	443
età media	57.1	56.2	56.4	58.6	57.2	57.4	58.6	55.9	57.1	56.4	57.4	57.2
% maschi	71.6	70.1	73.5	71.3	69.6	70.4	79.2	74.9	74.6	73.9	77.7	76.1
% femmine	28.4	29.9	26.5	28.7	30.4	29.6	20.8	25.1	25.4	26.1	22.3	23.9
% nativi	77.7	75.0	79.2	75.0	79.9	79.4	81.4	79.8	83.1	80.8	82.9	84.7
% non nativi	22.3	25.0	20.8	25.0	19.4	20.2	18.2	20.2	15.9	19.2	17.1	15.3
% residenti area metropolitana	87.8	85.2	90.2	86.9	87.2	84.6	87.0	86.8	87.8	84.6	88.5	88.9
% residenti fuori area metropolitana	12.2	14.4	9.5	12.7	12.5	14.2	12.7	13.0	12.2	15.4	11.5	10.2
% senza fissa dimora (SFD)	0.7	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.3	0.3	0.3	0.9	0.0	1.1
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% solo alcol	89.9	90.5	90.2	93.9	90.0	91.4	91.2	93.3	94.6	91.5	89.0	94.4
% abuso concomitante di sostanze illegali	10.1	9.5	9.8	6.1	10.0	8.6	8.8	6.7	5.4	8.5	11.0	5.6
di cui % eroina e cocaina	0.3	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.6	0.8	0.2
di cui % eroina (no cocaina)	1.7	2.1	1.9	0.4	1.7	1.1	2.6	3.1	0.3	0.6	2.8	0.5
di cui % cocaina (no eroina)	4.1	3.9	3.0	2.5	3.1	1.1	1.3	0.8	0.7	0.6	0.8	0.5
di cui % cannabis (no eroina, no cocaina)	1.7	1.8	0.4	1.2	2.1	2.2	1.6	0.3	0.7	1.9	0.8	1.1
di cui % altre sostanze illegali	3.4	3.2	3.0	2.5	2.8	3.4	3.6	2.1	3.1	3.5	4.9	3.4
% abuso concomitante di psicofarmaci	1.4	3.2	3.8	3.3	6.6	2.6	2.9	4.7	2.4	5.7	4.3	3.6
% Pronto soccorso	13.2	13.4	19.3	24.2	17.3	16.9	17.3	18.9	25.1	24.5	23.0	16.0
% Psichiatria***	-	0.7	0.8	0.8	0.0	1.9	1.3	3.9	1.7	2.8	3.3	1.6
% SERT	4.1	3.9	4.2	7.8	4.8	5.2	6.8	4.4	7.5	9.4	6.9	5.4
di cui % anche Carcere	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

** persone presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

*** dati non rilevabili per l'anno 2021

Tab. 27 - Gioco problematico*. Caratteristiche persone in carico al SERT. Periodo 2010-2021

		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
	Numero totale	197	218	233	186	200	183	171	145	84	55	36	38	32
sesto nuovo/già in carico	% femmine	17.8	20.6	20.6	19.4	18.5	19.7	18.7	59.0	26.2	20.0	19.4	10.5	18.8
	% nuovi	28.9	26.6	38.6	49.5	45.0	40.4	50.3	55.9	66.7	54.5	41.7	21.1	46.9
	età media all'ingresso	49.8	50.9	47.0	49.9	46.3	49.5	45.1	48.5	49.2	45.7	46.1	46.9	47.5
	nazionalità % non nativi	11.7	10.1	6.9	8.6	10.0	8.7	11.1	11.7	11.9	7.3	8.3	7.9	6.3
residenza	% fuori area metropolitana	5.1	3.7	5.1	5.4	5.0	6.0	5.8	9.0	8.3	5.5	5.6	5.3	3.1
stato civile	% celibe/nubile	45.7	41.3	41.2	42.5	39.5	45.9	42.7	35.9	40.5	50.9	30.6	23.7	28.1
	% coniugato	32.5	35.3	31.8	30.6	33.5	33.9	32.7	35.2	38.1	34.5	55.6	60.5	53.1
	% separato/divorziato/vedovo	19.8	22.5	12.1	25.8	25.5	19.1	12.3	12.4	21.4	12.7	13.9	15.8	18.8
titolo di studio	% elementari	6.1	5.0	5.2	8.6	5.5	5.5	8.8	13.1	16.7	7.3	11.1	15.8	12.5
	% media inferiore	29.9	36.7	48.1	37.1	37.5	38.8	42.7	40.0	32.1	29.1	27.8	36.8	31.3
	% qualifica professionale	11.7	10.6	5.2	10.8	11.0	14.2	10.5	8.3	9.5	14.5	5.6	7.9	9.4
	% media superiore	36.0	29.4	26.6	30.6	32.5	27.9	28.7	28.3	34.5	29.1	36.1	31.6	34.4
	% livello universitario	6.1	5.0	7.7	7.0	8.0	5.0	5.3	6.2	6.0	3.6	11.1	7.9	6.3
	% sconosciuto	7.6	13.3	7.3	5.4	5.5	6.6	4.0	4.1	1.2	16.4	8.3	0.0	6.3
condizione lavorativa	% disoccupato/in cerca di occupazione	12.7	12.8	13.7	21.1	16.0	16.4	16.4	11.7	13.1	12.0	11.1	13.2	12.5
	% lavori precari/occupato regolarmente	61.5	64.2	61.8	60.2	63.0	59.0	56.7	55.9	60.7	54.5	66.7	63.2	56.3
	% pensione	22.8	20.2	22.3	21.5	15.0	18.8	12.3	24.1	22.6	20.0	13.9	23.7	25.0
	% studente	0.5	0.0	0.9	1.6	2.0	1.6	1.8	0.7	1.2	3.6	2.8	0.0	0.0
presa in carico esito programma	durata media in mesi	38.3	32.0	16.5	16.1	24.0	14.5	13.2	9.5	9.4	21.0	20.0	35.0	39.4
	% completato	11.7	10.6	7.3	2.7	9.0	5.5	3.5	3.4	0.0	1.8	19.4	28.9	28.1
	% dimissione concordata	6.1	3.2	1.3	3.2	4.5	7.1	4.7	6.9	3.6	3.6	5.6	7.9	12.5
	% passaggio altra struttura	6.1	2.3	0.4	0.5	0.0	0.0	0.6	1.4	0.0	0.0	8.3	7.9	3.1
	% abbandono	3.6	9.6	9.4	4.8	8.5	7.7	5.8	5.5	1.2	3.6	8.3	7.9	6.3
	% chiusura d'ufficio	7.1	14.7	15.5	18.8	12.0	18.6	22.8	20.7	31.0	9.1	19.4	26.3	25.0
	% decesso	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.6	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
	% in corso	65.0	59.2	66.1	69.4	65.5	61.2	62.0	62.1	64.3	80.0	36.1	18.4	21.9
altre dipendenze	% altre dipendenze	3.5	2.4	1.7	3.3	5.0	6.6	3.0	7.0	10.7	25.5	30.6	26.3	25.0
	di cui % alcol	1.5	1.4	1.3	2.2	3.5	3.8	1.8	2.8	4.8	14.5	25.0	18.4	18.8
	di cui % cocaina	0.0	0.5	0.4	1.1	1.0	1.1	0.6	1.4	1.2	7.3	5.6	2.6	0.0
	di cui % eroina	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	2.6	3.1
	di cui % tabacco	0.5	0.5	0	0	0.0	0.0	0.6	2.1	2.4	1.8	0.0	2.6	3.1
	di cui % altro	1.5	0.0	0	0	0.5	1.6	0	0.7	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	% ex utente SERT Tossicodipendente	3.0	2.3	1.3	2.7	4.0	3.8	2.9	3.4	3.6	-	-	-	-
	% ex utente SERT Alcolista	3.6	0.9	1.3	1.6	2.5	2.2	2.3	2.8	2.4	-	-	-	-

* persone che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti al gioco problematico

Tab. 29 - Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico.
Incidenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni per sesso e nazionalità. Periodo 2010-2021

		Totale												
		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol		0.95	0.95	1.14	1.08	1.04	1.02	1.15	1.62	1.39	1.42	1.44	1.30	1.09
illegali		0.68	0.62	0.88	0.73	0.71	0.73	0.72	0.90	0.97	0.77	0.88	0.88	0.78
oppioidi		0.16	0.16	0.18	0.13	0.20	0.20	0.21	0.31	0.17	0.25	0.35	0.31	0.32
cocaina		0.28	0.27	0.38	0.31	0.31	0.22	0.24	0.23	0.23	0.20	0.25	0.22	0.19
gioco		0.09	0.10	0.14	0.10	0.11	0.12	0.14	0.14	0.11	0.06	0.03	0.02	0.02
		Maschi												
		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol		1.34	1.34	1.65	1.59	1.47	1.39	1.70	2.27	1.97	2.05	2.17	1.91	1.62
illegali		0.96	1.00	1.34	1.14	1.12	1.07	1.14	1.27	1.36	1.17	1.31	1.27	1.15
oppioidi		0.21	0.23	0.27	0.19	0.29	0.26	0.32	0.41	0.24	0.37	0.53	0.49	0.48
cocaina		0.43	0.44	0.62	0.53	0.52	0.37	0.39	0.39	0.41	0.36	0.41	0.39	0.31
gioco		0.16	0.16	0.24	0.16	0.19	0.21	0.25	0.24	0.17	0.10	0.04	0.04	0.04
		Femmine												
		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol		0.56	0.56	0.65	0.59	0.62	0.65	0.62	0.99	0.81	0.80	0.72	0.69	0.55
illegali		0.41	0.25	0.44	0.33	0.30	0.40	0.30	0.52	0.58	0.38	0.45	0.49	0.41
oppioidi		0.11	0.10	0.10	0.07	0.11	0.14	0.11	0.22	0.09	0.14	0.17	0.13	0.16
cocaina		0.13	0.10	0.14	0.10	0.11	0.07	0.09	0.08	0.06	0.05	0.08	0.05	0.07
gioco		0.02	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.02	0.02	0.01	-
		Nativi												
		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol		0.75	0.78	0.97	0.89	0.86	0.83	1.01	1.35	1.15	1.12	1.19	1.07	0.90
illegali		0.60	0.59	0.78	0.66	0.68	0.66	0.67	0.84	0.92	0.71	0.84	0.83	0.74
oppioidi		0.15	0.15	0.15	0.11	0.18	0.18	0.20	0.30	0.16	0.25	0.34	0.29	0.31
cocaina		0.25	0.24	0.34	0.29	0.31	0.20	0.23	0.24	0.22	0.18	0.25	0.21	0.18
gioco		0.08	0.09	0.14	0.11	0.11	0.13	0.14	0.13	0.10	0.07	0.03	0.03	0.02
		Non Nativi												
		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol		2.06	1.87	2.15	2.18	2.05	2.09	2.00	3.19	2.73	3.25	3.08	2.93	2.55
illegali		1.12	0.83	1.47	1.14	0.89	1.13	0.98	1.22	1.28	1.15	1.16	1.26	1.10
oppioidi		0.25	0.23	0.35	0.22	0.31	0.27	0.29	0.39	0.23	0.28	0.44	0.42	0.39
cocaina		0.46	0.40	0.60	0.45	0.32	0.34	0.30	0.20	0.29	0.35	0.27	0.28	0.22
gioco		0.14	0.15	0.13	0.08	0.12	0.11	0.18	0.23	0.13	0.01	0.05	0.01	0.02

Tab. 30 - Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico.
Prevalenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2021.

	Alcol			Illegali			Gioco		
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
Area metropolitana	4.21	1.58	2.89	6.96	1.88	4.41	0.49	0.10	0.29
Distretto di Casalecchio	4.62	1.65	3.13	5.22	1.62	3.41	0.71	0.08	0.39
CASALECCHIO DI RENO	3.13	1.50	2.30	4.70	1.59	3.11	0.52	0.17	0.34
MONTE SAN PIETRO	4.21	1.93	3.06	4.21	1.38	2.78	0.56	-	0.28
SASSO MARCONI	2.70	1.47	2.09	4.15	1.47	2.82	0.21	-	0.10
VALSAMOGGIA	6.87	1.35	4.15	5.83	1.84	3.86	0.85	0.10	0.48
ZOLA PREDOSA	5.26	2.36	3.80	6.53	1.57	4.04	1.27	-	0.63
Distretto Pianura Ovest	4.74	2.03	3.39	6.05	1.70	3.89	0.50	0.14	0.32
ANZOLA DELL'EMILIA	4.83	0.74	2.82	7.01	1.24	4.16	0.48	-	0.24
CALDERARA DI RENO	4.43	2.22	3.32	6.86	1.33	4.10	0.66	0.22	0.44
CREVALCORE	4.97	2.21	3.61	6.05	1.33	3.72	1.08	0.44	0.77
SALA BOLOGNESE	4.12	0.70	2.43	5.15	1.05	3.13	0.34	-	0.17
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	5.17	2.59	3.88	5.39	2.38	3.88	0.22	-	0.11
SANT'AGATA BOLOGNESE	3.82	2.83	3.34	6.49	2.02	4.32	0.38	0.40	0.39
Distretto Pianura Est	4.17	1.64	2.91	6.11	1.51	3.81	0.37	0.07	0.22
ARGELATO	5.20	1.55	3.39	7.03	0.62	3.85	0.61	-	0.31
BARICELLA	6.45	1.27	3.92	8.47	2.95	5.77	0.40	-	0.21
BENTIVOGLIO	4.72	0.52	2.62	3.67	1.57	2.62	-	-	-
BUDRIO	4.79	1.98	3.38	4.62	1.32	2.97	0.33	-	0.17
CASTELLO D'ARGILE	2.99	2.64	2.82	5.98	0.88	3.47	0.43	-	0.22
CASTEL MAGGIORE	3.33	2.22	2.76	5.00	1.43	3.17	0.83	-	0.41
CASTENASO	3.42	0.78	2.08	5.43	0.58	2.97	-	-	-
GALLIERA	4.18	1.10	2.68	9.93	1.10	5.64	0.52	-	0.27
GRANAROLO EMILIA	4.25	1.87	3.05	8.73	1.40	5.05	-	-	-
MALALBERGO	3.93	2.28	3.10	4.58	1.63	3.10	0.33	0.65	0.49
MINERBIO	4.27	1.68	2.99	5.58	2.69	4.15	0.66	-	0.33
MOLINELLA	3.23	1.54	2.40	5.90	2.12	4.02	0.57	0.19	0.38
PIEVE DI CENTO	4.80	1.33	3.07	5.67	2.65	4.17	-	0.44	0.22
SAN GIORGIO DI PIANO	4.32	1.30	2.79	4.99	1.62	3.29	0.33	-	0.16
SAN PIETRO IN CASALE	4.39	1.66	3.04	8.08	1.18	4.68	0.23	-	0.12
Distretto di S. Lazzaro	3.72	1.41	2.56	7.09	1.53	4.29	0.36	0.08	0.22
LOIANO	6.22	0.72	3.54	11.76	2.90	7.43	0.69	-	0.35
MONGHIDORO	4.00	3.58	3.80	8.81	0.89	5.07	-	-	-
MONTERENZIO	1.37	2.94	2.13	6.40	2.45	4.49	0.91	-	0.47
OZZANO DELL'EMILIA	3.47	1.29	2.38	6.51	0.22	3.35	0.22	0.22	0.22
PIANORO	4.44	1.94	3.18	6.57	2.64	4.60	0.35	-	0.18
SAN LAZZARO DI SAVENA	3.56	0.75	2.11	6.92	1.22	3.99	0.30	0.09	0.19
Distretto di Porretta	4.11	1.71	2.93	5.10	2.05	3.61	0.66	0.23	0.45
ALTO RENO TERME	4.14	2.72	3.42	2.76	3.17	2.97	0.46	-	0.23
CAMUGNANO	-	-	-	3.44	3.77	3.60	3.44	-	1.80
CASTEL D'AIANO	5.03	1.78	3.46	1.68	-	0.86	-	-	-
CASTEL DI CASIO	3.62	0.93	2.30	1.81	0.93	1.38	-	-	-
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	1.72	1.81	1.76	5.16	2.41	3.82	1.15	-	0.59
GAGGIO MONTANO	6.81	0.64	3.77	4.33	2.55	3.46	-	0.64	0.31
GRIZZANA MORANDI	8.35	1.61	5.08	9.10	1.61	5.47	0.76	-	0.39
LIZZANO IN BELVEDERE	2.91	-	1.49	2.91	1.52	2.23	1.45	-	0.74
MARZABOTTO	6.21	1.31	3.74	7.99	2.18	5.06	0.44	0.87	0.66
MONZUNO	3.18	2.89	3.04	5.00	2.41	3.74	1.36	-	0.70
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	3.43	0.77	2.18	7.54	2.32	5.09	-	0.77	0.36
VERGATO	2.40	2.51	2.45	4.79	0.84	2.86	0.40	-	0.20
Distretto Bologna città	4.10	1.46	2.76	8.27	2.19	5.19	0.47	0.08	0.27
BOLOGNA	4.10	1.46	2.76	8.27	2.19	5.19	0.47	0.08	0.27

**Tab. 31 - Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico.
Incidenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2021.**

	Alcol			Illegali			Gioco		
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
Area metropolitana	1.34	0.56	0.95	0.96	0.41	0.68	0.16	0.02	0.09
Distretto di Casalecchio	1.39	0.51	0.95	0.82	0.27	0.54	0.24	-	0.12
CASALECCHIO DI RENO	1.22	0.67	0.94	0.78	0.33	0.55	0.17	-	0.09
MONTE SAN PIETRO	2.25	0.28	1.25	0.56	0.28	0.42	0.28	-	0.14
SASSO MARCONI	0.83	0.21	0.52	-	0.42	0.21	-	-	-
VALSAMOGGIA	1.79	0.39	1.10	1.03	0.19	0.62	0.28	-	0.14
ZOLA PREDOSA	0.96	0.79	0.87	1.27	0.16	0.71	0.48	-	0.24
Distretto Pianura Ovest	1.35	0.83	1.09	0.96	0.62	0.79	0.11	0.07	0.09
ANZOLA DELL'EMILIA	1.45	-	0.73	0.72	0.50	0.61	0.24	-	0.12
CALDERARA DI RENO	1.55	0.67	1.11	1.55	0.89	1.22	0.22	0.22	0.22
CREVALCORE	1.08	1.33	1.20	0.43	0.88	0.66	-	-	-
SALA BOLOGNESE	1.37	0.35	0.87	1.72	1.05	1.39	-	-	-
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	1.51	0.97	1.24	0.65	0.32	0.49	-	-	-
SANT'AGATA BOLOGNESE	0.76	1.62	1.18	1.53	0.40	0.98	0.38	0.40	0.39
Distretto Pianura Est	1.51	0.68	1.10	0.92	0.44	0.68	0.13	-	0.06
ARGELATO	1.22	0.93	1.08	0.92	-	0.46	0.31	-	0.15
BARICELLA	3.23	0.42	1.86	1.21	0.42	0.82	-	-	-
BENTIVOGLIO	2.10	-	1.05	-	0.52	0.26	-	-	-
BUDRIO	2.64	0.99	1.82	0.50	0.49	0.50	0.17	-	0.08
CASTELLO D'ARGILE	0.85	0.44	0.65	0.85	0.44	0.65	-	-	-
CASTEL MAGGIORE	1.50	0.64	1.06	1.00	0.48	0.73	0.50	-	0.24
CASTENASO	1.01	-	0.49	0.80	-	0.40	-	-	-
GALLIERA	1.57	0.55	1.07	2.09	0.55	1.34	-	-	-
GRANAROLO EMILIA	0.94	0.70	0.82	1.65	0.70	1.17	-	-	-
MALALBERGO	1.96	0.98	1.47	0.98	0.33	0.65	0.33	-	0.16
MINERBIO	1.31	1.01	1.16	0.99	1.01	1.00	-	-	-
MOLINELLA	0.95	0.97	0.96	0.57	0.39	0.48	-	-	-
PIEVE DI CENTO	0.87	0.44	0.66	0.44	0.88	0.66	-	-	-
SAN GIORGIO DI PIANO	1.33	0.65	0.99	1.00	-	0.49	0.33	-	0.16
SAN PIETRO IN CASALE	1.39	0.95	1.17	1.15	0.71	0.94	-	-	-
Distretto di S. Lazzaro	1.27	0.47	0.87	0.71	0.27	0.49	0.12	0.04	0.08
LOIANO	2.77	0.72	1.77	0.69	0.72	0.71	-	-	-
MONGHIDORO	0.80	2.68	1.69	-	-	-	-	-	-
MONTERENZIO	0.46	0.49	0.47	1.37	0.49	0.95	0.46	-	0.24
OZZANO DELL'EMILIA	1.09	0.65	0.86	0.65	-	0.32	-	0.22	0.11
PIANORO	1.95	0.35	1.15	-	-	-	-	-	-
SAN LAZZARO DI SAVENA	0.99	0.19	0.58	1.09	0.47	0.77	0.20	-	0.10
Distretto di Porretta	1.54	0.63	1.09	0.66	0.80	0.73	0.05	-	0.03
ALTO RENO TERME	2.30	2.27	2.28	0.46	1.81	1.14	-	-	-
CAMUGNANO	-	-	-	-	-	-	1.72	-	0.90
CASTEL D'AIANO	3.36	-	1.73	-	-	-	-	-	-
CASTEL DI CASIO	2.72	-	1.38	-	0.93	0.46	-	-	-
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	0.57	-	0.29	-	1.21	0.59	-	-	-
GAGGIO MONTANO	2.48	0.64	1.57	-	1.28	0.63	-	-	-
GRIZZANA MORANDI	3.79	-	1.95	0.76	-	0.39	-	-	-
LIZZANO IN BELVEDERE	-	-	-	-	1.52	0.74	-	-	-
MARZABOTTO	0.44	-	0.22	0.44	0.44	0.44	-	-	-
MONZUNO	0.91	1.45	1.17	1.36	0.96	1.17	-	-	-
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	2.06	-	1.09	2.06	-	1.09	-	-	-
VERGATO	0.80	0.84	0.82	1.20	0.42	0.82	-	-	-
Distretto Bologna città	1.24	0.47	0.85	1.11	0.36	0.73	0.17	0.02	0.09
BOLOGNA	1.24	0.47	0.85	1.11	0.36	0.73	0.17	0.02	0.09

Tab. 32 - Stima del sommerso. Periodo 2010-2021

	2021		2020		2019		2018		2017	
	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%
alcol	5151	4147-6155	6505	5054-7956	5208	4270-6147	3913	3338-4488	3732	3171-4294
illegali di cui oppioidi di cui cocaina	8562 3351 2636	6762-10362 2606-4096 2002-3269	7060 3411 2014	5744-8376 2735-4088 1649-2379	9379 3813 1927	7528-11231 2966-4660 1563-2291	5261 2326 1338	4587-5935 2100-2553 1169-1507	5418 2394 1516	4669-6167 2160-2627 1289-1743
Sconosciuti/Conosciuti	2021		2020		2019		2018		2017	
alcol	4.98		6.17		4.71		3.59		3.64	
illegali di cui oppioidi di cui cocaina	3.74 2.00 2.55		3.04 1.93 1.98		3.87 2.10 2.00		2.27 1.29 1.51		2.32 1.28 1.80	
	2016		2015		2014		2013		2012	
	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%
alcol	4034	3404-4665	3804	3257-4351	4461	3810-5111	3884	3343-4424	3848	3280-4416
illegali di cui oppioidi di cui cocaina	6270 2990 1269	5287-7253 2580-3400 1041-1498	8335 3492 1321	6700-9969 2854-4130 1040-1602	8533 3987 1354	6919-10147 3312-4661 1014-1693	6070 3232 911	5055-7084 2764-3700 741-1081	5387 3161 1052	4613-6161 2802-3520 885-1219
Sconosciuti/Conosciuti	2016		2015		2014		2013		2012	
alcol	4.05		3.58		4.18		3.63		3.90	
illegali di cui oppioidi di cui cocaina	2.62 1.55 1.79		3.46 1.75 1.89		3.58 1.97 2.14		2.56 1.61 1.61		2.25 1.47 1.44	
	2011		2010		2009					
	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%				
alcol	4135	3476-4795	4728	3989-5467	3784	3244-4324				
illegali di cui oppioidi di cui cocaina	6793 3141 1175	5663-7922 2774-3508 934-1416	8376 2933 967	6872-9880 2592-3275 755-1178	6157 2530 934	5156-7158 2326-2734 806-1061				
Sconosciuti/Conosciuti	2011		2010		2009					
alcol	4.16		4.32		3.52					
illegali di cui oppioidi di cui cocaina	2.73 1.40 1.75		3.25 1.33 1.61		2.40 1.13 1.19					

Tab. 33 - Sequestri di stupefacenti e operazioni antidroga da parte delle Forze dell'Ordine nella provincia di Bologna. Periodo 2010-2021*

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
KG EROINA	28.4	6.3	27.4	3.5	31.5	3.9	11.9	2.4	30.6	9.2	25.3	52.7	22.5
KG COCAINA	30.4	10.1	40.0	12.8	46.3	54.4	10.7	22.0	35.0	28.4	33.5	38.4	39.9
KG HASCISH	218.5	30.2	90.5	94.2	546.3	69.5	63.1	41.8	38.2	157.7	140.7	66.7	506.8
KG MARIJUANA	156.3	666.0	128.2	163.4	641.2	46.8	69.2	75.2	68.0	170.7	89.7	4.44	41.0
operazioni	304	368	448	274	411	448	328	489	652	574	616	483	544
denunce	375	433	480	477	574	572	398	606	616	709	888	696	825
arresti	244	278	325	384	488	471	308	493	542	621	790	573	708
minori denunciati	2	4	16	15	13	16	15	9	12	11	17	14	23
non nativi denunciati	59	206	296	329	447	466	286	375	410	461	569	385	451

*Fonte Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza

Tab. 34 - Accessi ai reparti di Pronto Soccorso dovuti all'uso di sostanze psicoattive, Area metropolitana di Bologna. Periodo 2010-2021

		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Accessi	Numero accessi per sostanze illegali	1278	1184	1318	1257	1171	1188	967	1208	1053	1044	910	655
	Accessi sostanze illegali/totale accessi *1.000	4.9	5.2	3.9	3.8	3.6	3.6	2.9	3.6	3.2	3.2	2.7	2.5
	Numero persone	940	819	885	919	902	886	686	806	777	453	416	516
	Media accessi per soggetto	1.36	1.45	1.58	1.38	1.44	1.36	1.46	1.51	1.33	1.28	1.32	1.41
Dati anagrafici (numero persone)	Maschi	697	635	701	727	703	663	548	609	631	352	328	424
	Femmine	243	184	184	186	199	223	138	197	146	101	88	92
	Nativi	655	573	585	644	645	619	474	608	590	365	341	378
	Non nativi	275	242	262	258	257	267	210	198	185	86	74	138
	Residenti area metropolitana Bologna	612	535	569	587	564	565	429	536	502	312	302	314
Non residenti	325	271	304	311	324	306	246	259	264	137	107	197	
Età (numero persone)	Età media	37.03	37.64	35.63	36.91	36.12	37.43	35.7	36.3	35.7	36.7	37.5	34.0
	<18 anni	38	25	45	43	44	27	21	25	18	12	10	9
	18-29	283	249	286	271	269	252	220	242	246	111	92	190
	30-39	252	206	233	220	235	234	192	225	218	136	125	157
	40-49	167	180	178	198	198	193	154	192	204	144	142	122
	50-59	142	117	122	144	130	139	87	105	82	48	42	29
	=>60	47	38	18	26	26	41	12	17	9	2	5	9
Giorno (numero persone)	Lunedì	184	148	183	192	151	171	129	165	140	143	129	108
	Martedì	161	193	181	185	178	156	150	150	136	129	121	73
	Mercoledì	196	183	168	165	170	175	132	186	125	144	128	95
	Giovedì	154	183	203	188	166	173	124	153	162	166	153	94
	Venerdì	194	151	162	185	166	148	130	193	165	137	124	96
	Sabato	189	169	203	172	172	184	148	186	170	171	119	97
	Domenica	200	157	218	170	168	181	154	175	155	154	136	92
Mese (accessi)	Gennaio	89	151	106	94	63	91	83	87	86	63	71	32
	Febbraio	86	104	83	91	81	102	70	94	72	96	58	44
	Marzo	77	79	126	109	103	91	82	118	96	95	78	56
	Aprile	108	53	101	106	93	100	74	111	93	86	67	40
	Maggio	183	90	131	104	108	107	60	118	92	91	56	40
	Giugno	111	97	140	111	109	99	79	117	84	98	82	42
	Luglio	137	114	102	116	124	115	96	93	93	78	116	75
	Agosto	87	129	104	116	109	97	107	94	82	101	91	74
	Settembre	101	92	106	100	93	87	94	100	97	84	74	63
	Ottobre	102	80	103	99	78	97	71	103	77	87	86	70
	Novembre	94	99	111	103	118	114	71	70	87	80	60	55
	Dicembre	103	96	105	108	92	88	80	103	94	85	71	64
Sostanza (accessi)	Allucinogeni	14	7	6	3	3	3	5	6	4	4	3	2
	Amfetamine	15	9	20	13	21	15	14	18	18	9	12	8
	Cannabis	260	249	304	255	213	173	153	180	201	162	104	70
	Cocaina	484	418	539	416	339	340	268	215	227	195	169	144
	Crack	9	5	6	2	2	1	0	0	0	0	0	0
	GHB	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	Ketamina	21	19	17	11	11	7	4	6	12	13	9	7
	MDMA/ecstasy	9	15	9	4	9	5	7	5	4	4	4	7
	Popper	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
	Altre sostanze illegali non indicate	391	228	296	424	456	522	354	527	273	307	251	182
	Oppioidi* (eroina o altri oppioidi)	196	203	239	268	186	205	211	368	455	452	439	284
	Metadone**	39	36	32	58	38	32	46	58	40	48	59	67
	Anche Alcol	372	315	358	337	314	352	263	329	204	235	208	113
	Anche Benzodiazepine	54	43	58	50	48	53	40	50	38	42	14	26
	Anche Altri Psicofarmaci	35	18	27	26	30	49	55	70	38	42	34	22

* sono stati esclusi gli accessi con farmaci contenenti oppioidi

** abuso o sindrome di astinenza

Tab. 35 - Accessi ai reparti di Pronto Soccorso per problemi alcol correlati, Area metropolitana di Bologna. Periodo 2010-2021

		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Accessi	Numero accessi per alcol	2921	2906	3548	3393	3112	3125	3054	3789	3327	3330	3266	2300
	Accessi alcol/totale accessi al PS*1.000	11.3	12.7	10.6	10.2	9.6	9.4	9.2	11.3	10	10.3	9.6	8.8
	Numero persone	1957	1825	2268	2224	2097	1994	2004	2426	2077	1386	1247	1570
	Media accessi per soggetto	1.49	1.62	1.60	1.53	1.74	1.64	1.65	1.73	1.73	1.59	1.83	1.73
Dati anagrafici (numero persone)	Maschi	1416	1315	1642	1610	1505	1402	1430	1744	1519	1040	931	1115
	Femmine	541	510	626	613	592	592	574	682	558	346	316	455
	Nativi	1285	1232	1512	1489	1371	1346	1382	1581	1381	907	852	967
	Non nativi	635	585	661	690	726	646	619	839	691	468	384	597
	Residenti area metropolitana Bologna	1387	1332	1605	1519	1392	1371	1385	1634	1397	1001	866	988
	Non residenti	556	468	641	676	691	586	573	761	655	378	381	576
Età (numero persone)	Età media	45.90	46.8	45.5	45.2	43.7	44.4	43.9	43.3	42.3	45.3	43.8	39.2
	<18 anni	69	58	69	74	76	50	76	73	59	25	36	46
	18-29 anni	403	338	503	515	483	477	477	557	545	233	252	477
	30-39 anni	278	248	349	308	346	317	304	485	384	284	260	323
	40-49 anni	356	356	418	426	420	408	405	509	420	347	282	332
	50-59 anni	348	371	390	367	373	318	330	349	310	211	184	219
	60-69 anni	239	218	266	237	199	210	218	221	178	140	114	113
	=>70 anni	227	225	259	256	200	214	194	232	181	146	119	60
Giorno (accessi)	Lunedì	415	348	429	462	408	385	414	484	371	401	416	293
	Martedì	391	387	496	461	394	389	380	460	483	419	418	269
	Mercoledì	390	437	519	439	388	390	421	525	443	419	416	269
	Giovedì	377	415	437	443	395	402	415	505	414	428	444	298
	Venerdì	394	404	481	460	414	452	399	505	422	491	417	352
	Sabato	485	464	572	548	486	533	487	631	555	563	567	429
	Domenica	469	451	614	580	627	574	538	679	639	609	588	390
	Mese (accessi)	Gennaio	224	381	306	299	215	272	246	338	347	292	250
Febbraio		189	312	245	223	247	229	218	325	233	301	249	164
Marzo		207	183	329	320	260	265	239	342	313	333	275	194
Aprile		224	133	320	261	287	308	248	340	280	289	248	123
Maggio		298	207	266	281	266	236	260	395	259	253	261	139
Giugno		290	243	291	290	281	227	258	335	275	265	284	147
Luglio		281	295	292	306	274	269	272	267	267	260	295	179
Agosto		250	269	286	263	230	268	250	305	228	217	242	212
Settembre		243	248	314	274	272	243	268	297	295	294	301	223
Ottobre		241	244	300	270	193	276	285	277	288	238	316	209
Novembre		244	199	290	281	280	289	263	291	273	260	271	258
Dicembre		230	192	309	325	307	243	247	277	269	328	274	263
Sostanza (accessi)		Almeno anche una sostanza legale o illegale	371	450	518	458	435	533	496	450	538	532	360
	Almeno anche una sostanza illegale	369	339	350	307	314	415	317	330	364	362	277	183
	di cui Allucinogeni	3	2	0	0	0	0	2	2	1	2	1	0
	di cui Amfetamine	3	3	4	2	8	6	4	6	5	3	2	1
	di cui Cannabis	75	79	76	69	57	54	49	65	50	58	26	19
	di cui Cocaina	177	123	170	123	82	106	83	55	53	40	36	26
	di cui Ketamina	5	8	3	3	4	3	0	0	6	6	4	2
	di cui MDMA/ecstasy	4	2	3	2	2	3	4	3	1	2	0	2
	di cui altre sostanze illegali non indicate	113	86	88	81	72	175	76	129	176	179	125	83
	Anche Oppioidi* (eroina o altri oppioidi)	44	46	52	58	37	47	48	77	49	44	36	29
	Anche Metadone**	1	3	3	9	4	1	8	12	4	4	8	3
	Anche Benzodiazepine	27	59	79	71	70	93	85	49	41	44	39	27
	Anche Altri Psicofarmaci	6	90	133	111	86	94	205	111	82	88	69	49

* sono stati esclusi gli accessi con farmaci contenenti oppioidi

** abuso o sindrome di astinenza

Tab. 36 - Allerta rapida droghe Bologna. Decessi per overdose e accessi al pronto soccorso per overdose: caratteristiche dei persone e rapporto con i servizi. Periodo 2012-2021

decessi nel territorio Area Metropolitana di Bologna											Accessi al PS nel territorio Area Metropolitana di Bologna										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Totale	16	23	13	17	17	11	20	23	10	10	113	112	98	86	85	69	50	67	47	37	
Età media	36.9	40.0	39.0	40.6	40.7	42.4	45.3	40.3	45.5	42.0	36.3	37.9	38	38.2	37.9	36.4	40.2	38.2	39.6	41.9	
% Femmine	6.3	8.7	7.7	0.0	17.6	36.4	30.0	26.1	0.0	0.0	24.8	10.7	11.2	11.6	23.5	21.7	18.0	10.4	14.9	21.6	
% Non nativi	31.3	21.7	7.7	17.6	5.9	9.1	5.0	8.7	30.0	10.0	12.4	24.1	19.4	22.4	31.8	21.7	28.0	38.8	36.2	27.0	
% Non residenti	31.3	43.5	38.5	35.3	29.4	27.3	35.0	39.1	20.0	20.0	47.8	55.4	45.9	51.8	47.1	44.9	36.0	46.3	44.7	45.9	
% Sconosciuti al SERT	43.8	21.7	30.8	29.4	47.1	45.5	45.0	43.5	30.0	20.0	87.6	73.2	46.9	52.9	49.4	50.7	36.0	61.2	46.8	43.2	

Tab. 37 – Allerta rapida droghe Bologna. Accessi al pronto soccorso per intossicazione alcolica acuta*: caratteristiche all'arrivo al Pronto Soccorso. Area Metropolitana di Bologna. Periodo 2010-2021.

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	1661	1680	2188	1971	1729	1919	1602	2538	2000	1983	1992	1398	1468
% <18 anni	3.8	3.6	3.4	3.5	4.4	2.7	4.0	2.8	2.7	2.5	2.3	3.6	2.3
% 18-29 anni	22.8	18.3	22.8	23.5	23.5	22.3	24.8	20.9	27.5	23.2	11.8	31.3	28.5
% 30-39 anni	17.3	18.9	17.8	15.9	19.2	17.1	16.7	23.1	21.2	23.1	14.2	22.2	21.7
% 40-49 anni	22.8	25.5	24.0	22.7	22.2	22.7	22.2	22.4	22.4	22.5	16.2	23.4	21.2
% 50-59 anni	17.9	20.2	18.3	16.8	17.4	17.1	15.7	13.6	12.6	12.8	9.5	11.1	14.8
% =>60 anni	13.0	11.9	12.3	15.8	11.2	16.9	14.8	13.5	10.1	11.6	6.1	7.1	8.6
% Non noto	2.3	1.7	1.4	1.9	2.2	1.3	1.7	3.7	3.7	4.2	40.0	1.4	2.9
Età media	41.8	43.2	42.0	41.7	41.0	43.3	41.8	41.8	39.4	40.8	40.7	37.4	39.1
% Femmine	24.7	23.8	26.8	27.9	28.7	29.7	28.3	28.1	26.1	25.0	23.1	27.0	26.4
% Non nativi	42.8	45.2	40.1	41.1	44.9	37.9	35.8	42.5	39.6	40.4	34.8	43.5	35.4
% Non residenti in area metropolitana	32.3	38.1	37.2	35.9	42.7	32.9	32.2	37.8	39.1	38.3	42.0	43.1	38.6
% Arrivo al ps di notte (dalle 20 alle 8)	64.4	62.4	64.9	59.8	66.8	62.7	67.0	37.4	63.3	38.7	59.9	29.7	67.2
% Arrivo nel week end	47.9	43.0	46.9	45.7	48.8	50.2	50.9	29.1	47.4	30.4	47.0	23.6	50.5
% Forze dell'ordine	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8	0.3	0.9	0.5	0.4	0.7	0.6	0.9	1.0
% Codice triage rosso	6.2	4.8	5.0	4.4	3.1	3.4	3.0	2.6	2.1	1.8	1.2	2.1	2.2
% Almeno un'altra sostanza psicoattiva illegale	13.0	12.7	11.0	10.1	10.0	12.4	7.2	6.8	10.5	9.6	7.5	7.8	5.6

* Keywords: "abuso" & "alcol"; "abuso" & "alcol"; "abuso" & "etil"; "abuso" & "etanolic"; "intossicazione" & "alcol"; "intossicazione" & "alcol"; "intossicazione" & "etil"; "esotossicosi etil"; "esotossicosi alc"

Per la metodologia utilizzata cfr. Pavarin RM et al., Cocaine-related medical and related problems: a consecutive series of 743 patients from a multicentre study in Italy, in European Journal of Emergency Medicine, 2011 Aug;18(4):208

