



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

DSM-DP
UOS Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche

Rapporto 2015 sulle dipendenze in area metropolitana

*quadro epidemiologico
caratteristiche tossicodipendenti, alcolisti e giocatori d'azzardo patologici,
attività dei servizi*

A cura di Raimondo Maria Pavarin
Con la collaborazione di Silvia Marani, Elsa Turino, Giovanni Coccagna

Azienda USL di Bologna
DSM-DP
UOS Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche

Via S. Isaia, 94/A
Tel. 051/6584313 – Fax. 051/6584315
<http://www.ausl.bologna.it/oem>

Si ringraziano

*Luana Capitani – AUSL di Bologna – U.O.S.D Ser. T Bologna Ovest
Roberto Ragazzi – AUSL Bologna – U.O.S.D. Ser. T Bologna Nord
Orietta Venturi – AUSL di Bologna – Equipe carcere U.O.S.D. Ser. T Bologna Nord
Stefania Bongiovanni e Daniele Campedelli – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser. T Bologna Pianura Ovest
Catia Leoni – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Sert Bologna Est
Elisabetta Bacchini – AUSL di Bologna – U.O.C Ser. T, Sert Budrio
Giorgia Paoletti – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser.T San Lazzaro di Savena
Leonardo Piscitelli – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser.T. Casalecchio-Porretta, Ser. T. Vergato
Cristina Nasonte – AUSL di Bologna – U.O.C Ser. T, Sert San Giorgio di Piano
Simona Sarti – AUSL di Bologna – U.O.S.D. Ser.T. Casalecchio-Porretta, Ser. T. Zola*

*Moreno Astorri – Opera Padre Marella, Comunità “La Sorgente”
Silvia Garagnani – Cooperativa Sociale “Il Pettiroso”
Cinzia Tavalazzi– Centro Accoglienza “La Rupe-Quadrifoglio”
Hazem Cavina – Cooperativa Sociale “ASAT”*

*Francesca Puccetti – Ausl Bologna – U.O.C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Maggiore
Mimosa Balloni – Azienda Ospedaliero Universitaria S.Orsola-Malpighi cDipartimento ad attività integrata emergenza/urgenza
Vincenza Perlangeli – Ausl Bologna – U.O.C. Epidemiologia, promozione della salute e comunicazione del rischio
Antonietta Moschetti – Azienda Ospedaliero Universitaria S.Orsola-Malpighi – Tecnologie e Sistemi Informatici*

Sono inoltre disponibili on line sul sito dell’Osservatorio.

<http://www.ausl.bologna.it/oem>

1 – Dati statistici

2 – Mappa dei servizi pubblici e privati per le dipendenze in area metropolitana

Il quadro¹

Sostanze illegali: si sentono gli effetti della crisi economica?

In calo tendenziale a partire dal 2010 il numero di consumatori problematici di stupefacenti (nel dettaglio, diminuiscono per eroina e cannabis, aumentano per la cocaina).

Cambiano le caratteristiche socio economiche ed anagrafiche: è in aumento l'età media, la percentuale di residenti e di non nativi.

In calo il numero di soggetti con abuso concomitante di alcol e con uso di sostanze per via iniettiva.

Anche se con andamento altalenante, il calo si registra in tutti i settori di contatto (SERT, Carcere, Unità mobile metadone, Pronto soccorso e Ricoveri ospedalieri).

Anche se su numeri molto bassi (15 nel 2015 rispetto ai 12 nel 2014), si segnala l'aumento del numero di decessi per overdose.

Tra i residenti, diminuisce l'incidenza di consumo problematico per tutte le sostanze in entrambi i sessi, tranne per le femmine dove aumenta per la cocaina.

Il consumo di alcol

Diminuisce il numero complessivo e quello di nuovi accessi di persone con consumo problematico di alcol. Aumenta il numero di accessi al SERT ed al carcere. Si segnala il calo consistente negli accessi ai reparti di Pronto Soccorso (PS) e nelle dimissioni ospedaliere.

Tra i residenti, aumenta l'incidenza sotto i 20 anni di età per le femmine e per i non nativi.

I minori

Tra i residenti l'incidenza del consumo problematico, sia di alcolici che di sostanze illegali, risulta più elevata tra i soggetti con età compresa tra 15 e 19 anni. Questo vale in entrambi i sessi, sia tra i nativi che tra i non nativi.

Il gioco d'azzardo patologico

Nel corso del 2015 i SERT dell'ASL Bologna hanno preso in carico 171 soggetti, numero in aumento. La metà erano nuovi accessi, in calo età media e percentuale di femmine. Si segnala il drastico calo del numero di soggetti con altre dipendenze oltre al gioco patologico.

Il sistema di allerta rapida

Dopo la diminuzione registrata lo scorso anno, nel 2015 aumenta il numero di overdose letali, mentre invece diminuisce il numero di accessi per overdose ai reparti di Pronto Soccorso. In aumento il rapporto di letalità (decessi/stima numero consumatori di eroina), in considerazione anche del fatto che la stima del numero di eroinomani diminuisce. Sia per le overdose letali che per quelle non letali, si segnala l'aumento dell'età media, e la diminuzione della quota di non nativi e di soggetti non conosciuti dai SERT.

Cosa emerge dagli studi

- Tra gli utenti dei SERT i tassi di ricovero ospedaliero si riducono in modo più accentuato rispetto ai corrispondenti tassi della popolazione generale, in modo particolare per le malattie infettive e per i disturbi psichici.
- Tra i soggetti con abuso di eroina, le caratteristiche dei soggetti che non si sono mai rivolti ai SERT riflettono la presenza di una popolazione clandestina di persone difficilmente raggiungibili, che hanno un elevato rischio di decesso e che si rivolgono ai servizi sanitari solo in casi di emergenza.
- Per quanto riguarda l'epatite B, la vaccinazione universale obbligatoria non sembra risolvere il problema della trasmissione dell'HBV in gruppi ad alto rischio.
- Nel periodo 2009/2015, vi sono stati 412 accessi al pronto soccorso di minori per problemi dovuti all'abuso di alcol. Si stimano 6.6 accessi alcol correlati ogni mille accessi al Pronto Soccorso e una incidenza di 1.6 su mille residenti, dati entrambi in aumento.
- Tra i soggetti seguiti dai SERT per problemi dovuti all'alcolismo, il rischio di mortalità è di almeno 5 volte più alto rispetto alla popolazione generale. Tale rischio è maggiore per i soggetti senza lavoro e durante il primo anno di presa in carico.

¹A cura di Raimondo Maria Pavarin

1 - Il consumo problematico di sostanze illegali

Rispetto agli anni precedenti, aumenta l'età media e diminuisce il numero di soggetti che si sono rivolti ad un SERT, o ad un pronto soccorso o che sono stati ricoverati in un ospedale per problemi dovuti al consumo di sostanze illegali (Consumo Problematico – CP). Il calo si registra tra tutte le diverse tipologie di consumatori (maschi e femmine, nativi e non nativi, residenti e non residenti) ed in tutti i servizi. Per quanto riguarda le sostanze, mentre diminuisce il numero di CP di oppioidi e cannabis, aumentano i CP di cocaina.

Tra i residenti, mediamente più anziani rispetto ai non residenti, osserviamo una quota più elevata di femmine e di accessi al SERT. Tra i non residenti invece troviamo una percentuale più alta di non nativi e di CP di cocaina. I non nativi si caratterizzano per l'elevata prevalenza di soggetti con CP di cocaina e di cannabis.

Per quanto riguarda le sostanze di abuso, il 95% dei soggetti con problemi dovuti ad abuso di oppioidi sono seguiti dai SERT. Tra le persone con abuso di cocaina osserviamo la quota più elevata di non nativi e di non residenti; le persone con consumo problematico di cannabis si rivolgono ai servizi sanitari ospedalieri in percentuale più elevata rispetto ai consumatori problematici di oppioidi e di cocaina. Da rilevare che l'incidenza su mille residenti è più elevata tra i CP di cocaina ed il rapporto sconosciuti/conosciuti (consumatori stimati/consumatori che si rivolgono al SERT) è più alto tra i CP di cannabis.

Le sostanze di abuso

		Oppioidi	Cocaina	Cannabis
Caratteristiche	Numero	2400	1058	487
	Età media	40.9	37.8	33.6
	% nuovi	10.1	22.8	33.1
	% femmine	20.0	15.1	14.6
	% non residenti	23.5	30.5	26.5
	% non nativi	20.9	29.5	29.2
Servizi	% SERT	95.2	86.5	78.4
	% Pronto Soccorso	5.6	12.8	14.0
	% Ospedale	4.0	6.6	11.3
Dati epidemiologici	Incidenza x 1000 residenti	0.19	0.29	0.21
	Prevalenza x 1000 residenti	3.25	1.31	0.65
	Stima numero oscuro	3480	1288	709
	Rapporto sconosciuti/conosciuti	1.8	1.9	2.5

Per quanto riguarda i servizi, l'accesso è più frequente al SERT, soprattutto per soggetti con problemi dovuti all'eroina. L'ospedale si caratterizza per una fascia di utenza con età mediamente più elevata e per la maggiore presenza di femmine; il Pronto Soccorso per la maggiore presenza di non residenti, di non nativi e di persone con problemi dovuti all'uso di cocaina e di cannabis. Altro aspetto degno di nota riguarda i nuovi contatti, ed i servizi sanitari ospedalieri (PS ed Ospedale) si confermano come il principale punto di primo accesso per casi incidenti con consumo problematico di sostanze illegali.

Nel corso del tempo aumenta la percentuale degli utenti SERT che ripetono ogni anno il test per HIV, Epatite C ed Epatite B. Si segnala inoltre il calo della quota di siero-conversioni.

Il monitoraggio dello stato di salute degli utenti SERT

% con un test nell'anno	HIV	Epatite C	Epatite B
2015	51.1	50.7	48.4
2014	45.1	45.0	44.0
2013	43.3	42.6	41.1
% siero-conversioni			
2015	0.0	0.8	0.0
2014	0.0	1.7	0.2
2013	0.0	1.8	0.1

2 - Il consumo problematico di alcol

Alcolisti: dati epidemiologici

	2015	2014
Incidenza x 1000 residenti	1.14	1.35
Prevalenza x 1000 residenti	3.27	3.71
Stima numero oscuro	3345	3986
Conosciuti/sconosciuti	3.8	4.4

Rispetto agli anni precedenti, aumenta l'età media e cala il numero di persone con CP di alcol. La diminuzione coinvolge tutte le diverse tipologie di soggetti (maschi e femmine, nativi e non nativi, residenti e non residenti) ed i servizi ospedalieri (Pronto Soccorso ed Ospedale), mentre invece aumentano gli alcolisti seguiti dal SERT (compreso il carcere) e gli utenti tossicodipendenti dei SERT con abuso concomitante di alcol.

Il calo del numero di soggetti con problemi alcol correlati si conferma anche utilizzando i dati relativi ai residenti. Diminuiscono infatti sia la prevalenza che l'incidenza. In diminuzione anche la stima del sommerso ed il rapporto conosciuti/sconosciuti.

3 – I non nativi

I non nativi con consumo problematico di alcol e di sostanze illegali non rappresentano un gruppo omogeneo, in quanto composto da soggetti di diversa nazionalità, tra cui si distinguono le persone provenienti da paesi dell'Europa dell'Est e dell'Africa mediterranea. In particolare per l'alcol si evidenziano nell'ordine i nativi dell'Europa dell'Est, dell'Africa mediterranea e dell'Asia; per le sostanze illegali i nativi dell'Africa mediterranea, dell'Europa dell'Est e di altri paesi europei. Per quanto riguarda le sostanze illegali, il 65% ha un consumo problematico dovuto ad uso oppioidi, il 40% dovuto ad uso di cocaina

Zona di provenienza dei non nativi

	Sostanze illegali	Alcol
Totale	772	630
% Europa Est	20.9	43.0
% Altri paesi europei	9.5	8.3
% Asia	6.1	11.1
% Africa Mediterranea	54.0	25.7
% Altra Africa	3.9	6.3
% America Latina	4.3	4.4

Per quanto riguarda i settori di contatto, la maggior parte dei soggetti con abuso di sostanze illegali si rivolge al SERT, in molti casi in seguito ad una carcerazione, mentre invece chi ha problemi con l'alcol accede di preferenza al Pronto Soccorso.

I servizi a cui si rivolgono i non nativi

	Sostanze illegali	Alcol
% Ospedale	6.0	17.3
% Pronto soccorso	13.0	56.0
% SERT	82.1	38.4
% di cui anche Carcere	47.7	8.9
% di cui anche Unità Mobile	14.4	2.2

4 – I residenti

Tra i residenti, in entrambi i sessi è in calo l'incidenza di consumo problematico di alcol, oppioidi e cannabis. Per quanto riguarda invece il consumo problematico di cocaina, l'incidenza è stabile tra i maschi ed in aumento tra le femmine.

Consumo problematico di sostanze illegali e di alcol – incidenza per mille residenti

	Alcol		Oppioidi		Cocaina		Cannabis	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
2015	1.69	0.61	0.28	0.11	0.48	0.10	0.36	0.07
2014	1.92	0.79	0.31	0.16	0.48	0.09	0.42	0.08
2013	1.91	0.73	0.31	0.09	0.57	0.08	0.50	0.09
2012	1.85	0.71	0.37	0.11	0.34	0.05	0.36	0.06
2011	1.83	0.64	0.45	0.13	0.39	0.07	0.32	0.05
2010	1.58	0.52	0.44	0.14	0.46	0.07	0.28	0.04
2009	1.72	0.62	0.61	0.20	0.33	0.08	0.29	0.04

Tra le persone con consumo problematico di sostanze illegali, l'incidenza su mille residenti è più elevata tra i non nativi, in particolare tra i soggetti con età inferiore a 30 anni. Sia tra i nativi che tra i non nativi si segnalano i CP con età compresa tra 20 e 34 anni.

Tra i soggetti con abuso di alcol, l'incidenza per mille residenti è più elevata tra i non nativi in tutte le classi di età; sia tra i nativi che tra i non nativi l'incidenza è più elevata nella fascia di età compresa tra 15 e 19 anni.

Nativi e non nativi: incidenza per mille residenti

	Sostanze illegali		Alcol	
	Nativi	Non nativi	Nativi	Non nativi
Totale	0.64	0.92	0.94	2.85
15-19 anni	0.89	1.07	1.50	2.56
20-24 anni	1.99	2.94	1.12	1.80
25-29 anni	1.18	1.35	1.02	1.92
30-34 anni	1.24	1.08	0.67	1.39
35-39 anni	0.62	0.61	0.82	2.14
40-44 anni	0.65	0.48	0.99	2.10
45-49 anni	0.31	0.72	0.87	2.04
50-54 anni	0.37	0.31	1.03	2.77
55-59 anni	0.17	0.00	1.06	1.83
60-64 anni	0.17	0.66	1.00	1.96

Sia per il consumo problematico di sostanze illegali, che per l'abuso di alcol, l'incidenza per mille residenti è più elevata tra i maschi in tutte le classi di età.

Per quanto riguarda le sostanze illegali, l'incidenza è più elevata per i maschi tra i 20 ed i 34 anni di età, tra le femmine nella fascia di età compresa tra 20 e 24 anni.

Per quanto riguarda l'alcol, sia tra i maschi che tra le femmine l'incidenza è più elevata nella fascia di età compresa tra 15 e 19 anni.

Differenze di genere: incidenza per mille residenti

	Sostanze illegali		Alcol	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Totale	1.10	0.28	1.69	0.61
15-19 anni	1.25	0.55	1.99	1.28
20-24 anni	2.98	1.30	1.29	1.18
25-29 anni	1.93	0.53	1.78	0.73
30-34 anni	2.21	0.19	1.35	0.35
35-39 anni	1.08	0.16	1.85	0.35
40-44 anni	1.10	0.16	1.67	0.62
45-49 anni	0.58	0.14	1.48	0.54
50-54 anni	0.55	0.18	1.85	0.59
55-59 anni	0.22	0.10	1.76	0.53
60-64 anni	0.25	0.15	1.84	0.52

5 – Gli accessi al pronto soccorso: casi incidenti

Il numero di soggetti che accedono per la prima volta ai PS per consumo problematico di sostanze illegali è in diminuzione rispetto al 2014. Diminuiscono l'età media e la quota di femmine, aumenta invece la quota di non nativi e di non residenti. Mentre rimane stabile la percentuale di "codici rossi", aumentano gli accessi coatti e gli arrivi di notte e nei week end. Diminuisce la quota di accessi per CP di oppioidi ed aumenta per CP di cannabis e CP di cocaina. Per quanto riguarda i problemi correlati, aumenta la percentuale di accessi per tentato suicidio, incidenti stradali, cadute accidentali ed overdose.

Il numero di nuovi accessi ai PS per CP di alcol è in diminuzione rispetto al 2014. Oltre alla percentuale di soggetti con più di un accesso, aumentano l'età media, la quota di femmine, gli arrivi di notte e nei week end. Diminuiscono invece gli accessi di non residenti e di non nativi; diminuisce inoltre la quota di accessi per abuso di alcol e per danni alcol correlati ed aumenta per dipendenza. Per quanto riguarda gli eventi traumatici, aumenta la percentuale di accessi per tentato suicidio e, soprattutto, per danni accidentali, incidenti stradali ed atti violenti. Si segnala l'aumento della percentuale di soggetti con abuso concomitante di sostanze illegali e di psicofarmaci.

6 – I ricoveri ospedalieri: casi incidenti

Tra i residenti è in calo rispetto al 2014 il numero di casi incidenti di ricoveri ospedalieri alcol correlati. In questa popolazione si osserva un aumento dell'età media e della percentuale di soggetti con più di un ricovero. Si segnala inoltre l'incremento della percentuale di ricoveri per patologie epatiche.

Anche il numero di casi incidenti di residenti ricoverati per abuso/dipendenza da sostanze illegali è in calo rispetto al 2014. Si segnala l'aumento dell'età media, della percentuale di femmine e della quota di non nativi, in particolare di soggetti provenienti da paesi dell'Europa dell'Est.

7 – I nuovi utenti dei SERT

Il numero di nuovi accessi ai SERT per CP di sostanze illegali è stabile rispetto allo scorso anno: diminuisce la percentuale di non residenti, di non nativi e di persone senza fissa dimora. Si segnala l'aumento del numero di residenti e l'incremento percentuale delle persone con dimora stabile, con lavoro regolare e di studenti; diminuisce invece la quota di positivi all'epatite C ed all'HIV.

Il numero di nuovi utenti SERT con dipendenza da alcol è stabile rispetto al 2014. Diminuiscono l'età media, la percentuale di femmine e di non nativi, mentre invece aumenta il numero di persone nate in paesi dell'Europa dell'Est.

In calo anche la percentuale di persone con scolarità medio alta e di soggetti con dimora stabile.

8 – L'impatto sul territorio

Nel territorio della regione Emilia Romagna, nel corso del 2015 rimane costante il numero di decessi per overdose, ma si puntualizza che il dato è in diminuzione rispetto al 2013. In aumento l'età media al decesso, la percentuale di femmine, la percentuale di non nativi e la quota di residenti. Aumentano i decessi nelle provincie di Bologna (ASL Bologna e ASL Imola), Parma e Piacenza. Si segnala il calo nella provincia di Forlì-Cesena.

Deceduti per overdose in Emilia Romagna, ovunque residenti*

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	23	23	29	23	19	13	28
Età media	42.3	40.3	37.9	39	37.9	38.5	38.9
% Femmine	13.0	0.0	6.9	8.7	5.3	15.4	21.4
% Non nativi	13.0	8.7	20.7	17.4	10.5	0.0	7.1
% Non residenti nella provincia del	17.4	26.1	37.9	21.7	21.1	38.5	10.7
Provincia decesso							
% Bologna	69.6	60.9	75.9	73.9	63.2	30.8	35.7
% Modena	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	23.1	17.9
% Parma	13.0	4.3	3.4	0.0	10.5	7.7	0.0
% Ravenna	0.0	4.3	0.0	8.7	10.5	0.0	17.9
% Reggio Emilia	0.0	4.3	6.9	13.0	5.3	15.4	14.3
% Ferrara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
% Forlì Cesena	8.7	21.7	3.4	0.0	5.3	7.7	7.1
% Piacenza	8.7	4.3	3.4	4.3	0.0	7.7	3.6
% Rimini	0	0.0	1	0	1	1	0

*<http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/sanita/rem/analisi-statistica>

Nell'area metropolitana di Bologna nel 2015, rispetto all'anno precedente, aumenta il numero di decessi per overdose e diminuisce il numero di accessi ai PS per overdose non letali. In aumento anche l'età media, che è di 44 anni per i decessi e di 38 anni per gli accessi ai PS.

Il sistema di allerta rapida*

	Decessi per overdose		Accessi ai PS per overdose	
	Numero	Età media	Numero	Età media
2012	16	36.9	113	36.4
2013	19	38.7	112	37.9
2014	12	39.4	98	38.0
2015	15	44.1	86	38.2

* <https://allertarapidadroghhebologna.ausl.bologna.it/Public/StatisticheMain.aspx>

Per valutare l'impatto sulla salute degli stili di vita, sono stati calcolati i tassi standardizzati di mortalità² alcol e droga correlata³ per 100 mila residenti, rispettivamente nell'area metropolitana di Bologna (AMB) e nella regione Emilia Romagna⁴ (esclusi i residenti nell'AMB) nel periodo 2006/2013.

Nell'Area metropolitana di Bologna nel 2013 si stimano meno di due decessi droga correlati e meno di tre decessi alcol correlati per 100 mila residenti, dato più elevato rispetto al resto del territorio regionale, ma in diminuzione.

La mortalità droga ed alcol correlata nel territorio

Tassi standardizzati per 100 mila residenti	Mortalità droga correlata		Mortalità alcol correlata	
	Bologna	Regione ER (no)	Bologna	Regione ER (no)
2006	2.30	1.30	7.20	5.90
2007	1.20	1.10	3.40	1.40
2008	1.50	0.90	2.80	2.50
2009	1.70	0.80	4.20	4.90
2020	1.40	0.60	2.80	2.00
2011	1.50	0.70	3.10	1.80
2012	2.40	0.60	3.40	2.20
2013	1.70	0.90	2.90	2.00

9 – I risultati degli studi pubblicati nella letteratura internazionale

Nel corso del 2005 sono stati pubblicati in riviste internazionali alcuni studi condotti nell'area metropolitana di Bologna. Qui di seguito la sintesi dei risultati.

La mortalità degli alcolisti utenti SERT⁵ - Studio di follow-up su 2363 soggetti seguiti dai SERT dell'ASL Bologna per problemi dovuti all'alcolismo nel periodo 1997/2013. I risultati confermano l'elevato rischio di mortalità, di almeno 5 volte più alto rispetto alla popolazione generale. Il rischio è maggiore per i maschi, per i soggetti senza lavoro, con età inferiore a 40 anni al momento del primo accesso al SERT, e durante il primo anno di presa in carico.

Accessi ai PS di minori per abuso di alcolici⁶ - Questo studio riporta i dati relativi agli accessi alcol correlati di soggetti con età compresa tra 12 e 17 anni nel periodo 2009/2014 nei reparti di pronto soccorso dell'Area Metropolitana di Bologna. Sono stati identificati 412 episodi che coinvolgono 391 soggetti: 37% femmine, 22% non nativi, 17% non residenti. Il 66% arriva di notte, il 52% nel fine settimana, il 26% in ambulanza. Nel 12% dei casi vi era anche uso di sostanze illegali, nel 4% di psicofarmaci. Si stimano 6.6 accessi dovuti all'alcol ogni mille accessi al PS e una incidenza di 1.6 su mille residenti, dati entrambi in aumento. La tendenza tra i più giovani a considerare l'alcol come una sostanza psicoattiva va osservata con molta attenzione, soprattutto in relazione a potenziali politiche di prevenzione. Si segnalano i minori non-nativi, i quali sembrano maggiormente esposti ai rischi di problematiche alcol correlate.

Lo stato di salute degli utenti dei SERT⁷ - Obiettivo di questo studio è il monitoraggio dello stato di salute degli utenti dei servizi per le tossicodipendenze dell'area metropolitana di Bologna mediante l'analisi delle

² Standard Italia 2011

³ Randall, D., Roxburgh, A., Gibson, A., & Degenhardt, L. (2009). Mortality among people who use illicit drugs: A toolkit for classifying major causes of death. NDARC Technical Report No. 301. Sydney: National Drug and Alcohol Research Centre, University of New South Wales.

⁴ Fonte dati: ISTAT

⁵ Pavarin R; Caputo F; Domenicali; Zoli; Bernardi; Gambini D "MORTALITY RISK IN A COHORT OF ITALIAN ALCOHOLIC INDIVIDUALS TREATED FOR ALCOHOL DEPENDENCE" DRUG AND ALCOHOL REVIEW

⁶ Pavarin R (2015). Accessi al pronto soccorso di minori per abuso di alcolici Risultati preliminari di uno studio condotto nell'area metropolitana di Bologna. RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA DELL'ADOLESCENZA

⁷ Pavarin RM, Gambini D, The state of health of the users of the services for drug addiction treatment of the Bologna local health authority. A study into the hospital admissions in the period 2004-2013 Le infezioni in medicina Infez Med

schede di dimissione ospedaliera (SDO). I tassi di ricovero standardizzati sono in diminuzione, con un calo più consistente tra gli utenti SERT rispetto alla popolazione generale. La probabilità di ricovero è sempre più elevata per gli utenti SERT rispetto alla popolazione generale, ma l'odds ratio si riduce nel 2013 rispetto al 2004, in modo più accentuato per le malattie infettive e per i disturbi psichici. I risultati evidenziano l'efficacia di un sistema di servizi a livello territoriale nel prendersi cura sia gli aspetti connessi alla dipendenza, che delle problematiche di tipo sanitario.

La mortalità degli eroinomani: utenti e non utenti SERT⁸ - In Europa la prevalenza di consumo problematico di eroina è in diminuzione ma, nonostante l'aumento del numero di pazienti trattati, un numero rilevante non si rivolge ai SERT. Obiettivo di questo studio di coorte su 959 soggetti residenti nell'area metropolitana di Bologna che si sono rivolti ad un servizio sanitario (ospedale, pronto soccorso) o ad un SERT per problemi dovuti all'uso di eroina nel periodo 2004/2013, è quello di valutare separatamente il rischio di decesso 1) per gli eroinomani utenti SERT 2) per gli eroinomani che non si sono mai rivolti ai SERT. Tra gli eroinomani non-utenti SERT il 28% dei decessi era per AIDS o malattie infettive (6% utenti SERT), il 17% per overdose (6% utenti SERT) e il 14% per cause violente (6% utenti SERT). Le caratteristiche dei soggetti che non si sono mai rivolti ai SERT riflettono la presenza di una popolazione clandestina di soggetti difficilmente raggiungibile, che ha un elevato rischio di decesso e che si rivolge ai servizi sanitari solo in casi di emergenza

Epatite B⁹ - Al fine di valutare il ruolo della vaccinazione universale HBV nella protezione contro comportamenti a rischio legati all'uso di sostanze illecite, 748 tossicodipendenti (511 maschi e 237 femmine), utenti dei SERT dell'area metropolitana di Bologna, sono stati testati per i marcatori HBV al primo accesso al servizio. Tra i soggetti nati dopo il 1981 il 6.2% era positivo. La vaccinazione universale obbligatoria non sembra risolvere il problema della trasmissione dell'HBV in gruppi ad alto rischio.

⁸ Pavarin RM, Mortality risk among heroin abusers: clients and non-clients of public treatment centers for drug addiction – Substance use and Misuse

⁹ Lugoboni F, Pavarin R, Resentera C, Gambini D (2015). Let It "B"? The Role of Hepatitis B Universal Vaccination Among Italian Problematic Drug Users. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH

Anno 2015 e precedenti: tabelle dei dati

- Tab. 1 Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2015
- Tab. 2 Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2015
- Tab. 3 Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" (1) contatti. Periodo 2004-2014
- Tab. 4 Consumatori problematici di eroina. Caratteristiche "nuovi" (1) contatti. Periodo 2013-2015
- Tab. 5 Caratteristiche soggetti con problemi alcol correlati. Periodo 2009-2015
- Tab. 6 Soggetti con problemi alcol correlati. Caratteristiche "nuovi" (1) contatti. Periodo 2009-2015
- Tab. 7 Consumo problematico alcol. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2015
- Tab. 8 Sequestri di stupefacenti e operazioni antidroga da parte delle Forze dell'Ordine nella provincia di Bologna. Periodo 2004-2015
- Tab. 9 Accessi ai reparti di Pronto Soccorso per abuso di sostanze illegali: casi incidenti per anno
- Tab. 10 Accessi ai reparti di Pronto Soccorso per abuso di alcol: casi incidenti per anno
- Tab. 11 Ricoveri di residenti per abuso/dipendenza sostanze illegali: casi incidenti
- Tab. 12 Ricoveri di residenti per abuso/dipendenza alcol: casi incidenti
- Tab. 13 Giocatori d'azzardo patologici in carico al SERT. Periodo 2009-2015
- Tab. 14 Utenti GAP 2015: esito del programma terapeutico per durata del trattamento
- Tab. 15 Nuovi utenti SERT con dipendenza da sostanze illegali
- Tab. 16 Nuovi utenti SERT con dipendenza da alcol
- Tab. 17 Consumo problematico sostanze psicoattive. Prevalenza per 1.000 residenti per sesso e per nazionalità - età 15/64. Periodo 2004-2014
- Tab. 18 Consumo problematico sostanze psicoattive. Incidenza per 1.000 residenti per sesso e per nazionalità – età 15/64. Periodo 2009-2015
- Tab. 19 Area Metropolitana di Bologna. Periodo 2012-2015. Decessi per overdose e accessi al pronto soccorso per overdose: caratteristiche dei soggetti e rapporto con i servizi
- Tab. 20 Il territorio: tassi standardizzati di mortalità droga-correlati e alcol-correlati per 100.000 residenti
- Tab. 21 Stima del sommerso
- Tab. 22 Deceduti per overdose in Emilia Romagna, ovunque residenti

Tab. 1 – Consumo problematico sostanze illegali*. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2015

	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%
Totale	3348		3405		3461		3440		3636		3862		3771	
nuovi accessi	636	19.0	751	22.1	737	21.3	738	21.5	828	22.8	837	21.7	898	23.8
età media	39.6		39.3		38.1		37.9		38.1		37.7		37.0	
maschi	2723	81.3	2777	81.6	2839	82.0	2775	80.7	2880	79.2	3050	79.0	2998	79.5
femmine	625	18.7	630	18.5	622	18.0	665	19.3	756	20.8	812	21.0	773	20.5
nativi	2575	76.9	2620	76.9	2697	77.9	2699	78.5	2890	79.5	3101	80.3	3083	81.8
non nativi	772	23.1	780	22.9	758	21.9	741	21.5	746	20.5	761	19.7	688	18.2
residenti area metropolitana	2490	74.4	2507	73.6	2467	71.3	2388	69.4	2572	70.7	2707	70.1	2611	69.2
residenti fuori area metropolitana	809	24.2	840	24.7	931	26.9	1011	29.4	1060	29.2	1081	28.0	1093	29.0
senza fissa dimora (SFD)	174	5.2	195	5.7	168	4.9	132	3.8	123	3.4	223	5.8	207	5.5
decesso overdose	15	0.4	12	0.4	19	0.5	16	0.5	8	0.2	5	0.1	8	0.2
oppioidi	2400	71.7	2534	74.4	2474	71.5	2598	75.5	2703	74.3	2817	72.9	2839	75.3
di cui eroina	2298	68.6	2349	69.0	2363	68.3	2485	72.2	2612	71.8	2732	70.7	2704	71.7
cocaina	1058	31.6	1001	29.4	920	26.6	821	23.9	790	21.7	921	23.8	1142	30.3
di cui solo cocaina	549	16.4	511	15.0	508	14.7	434	12.6	426	11.7	456	11.8	439	11.6
cannabinoidi	487	14.5	510	15.0	522	15.1	417	12.1	376	10.3	378	9.8	416	11.0
di cui solo cannabinoidi	205	6.1	217	6.4	238	6.9	193	5.6	166	4.6	141	3.7	132	3.5
altre sostanze illegali	290	8.7	339	10.0	315	9.1	326	9.5	356	9.8	359	9.3	418	11.1
benzodiazepine	55	1.6	55	1.6	56	1.6	77	2.2	101	2.8	100	2.6	95	2.5
anche altri farmaci**	68	2.0	89	2.6	54	1.6	70	2.0	121	3.3	205	5.3	162	4.3
anche alcol	465	13.9	476	14.0	460	13.3	444	12.9	484	13.3	526	13.6	623	16.5
uso Vena	1114	33.3	1146	33.7	1180	34.1	1254	36.5	1362	37.5	1473	38.1	1371	36.4
Ospedale	250	7.5	283	8.3	187	5.4	215	6.3	265	7.3	326	8.4	214	5.7
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	3.4	162	4.3
Pronto soccorso	371	11.1	480	14.1	685	19.8	632	18.4	610	16.8	408	10.6	449	11.9
SERT	2837	84.7	2854	83.8	2858	82.6	2908	84.5	3029	83.3	3189	82.6	3027	80.3
di cui anche Carcere	609	18.2	637	18.7	624	18.0	693	20.1	690	19.0	654	16.9	522	13.8
di cui anche Unità Mobile Metadone	172	5.1	181	5.3	131	3.8	140	4.1	147	4.0	196	5.1	172	4.6

* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali

** psicofarmaci, antidepressivi, barbiturici e anche altri farmaci non specificati

Tab. 2 - Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2015

	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%
Totale	772		780		758		741		746		761		688	
nuovi contatti	209	27.1	246	32.5	239	31.5	261	34.4	265	35.0	271	35.8	239	31.5
età media	34.6		33.7		33.6		32.8		32.9		32.7		32.2	
maschi	697	90.3	716	91.8	696	91.8	683	92.2	660	88.5	673	88.4	615	89.4
femmine	75	9.7	64	8.2	62	8.2	58	7.8	86	11.5	88	11.6	73	10.6
residenti area metropolitana	285	36.9	272	35.9	253	33.4	228	30.8	249	33.4	257	33.8	236	34.3
residenti fuori area metropolitana	449	58.2	460	60.7	458	60.4	484	65.3	496	66.5	457	60.1	427	62.1
senza fissa dimora (SFD)	72	9.3	98	12.9	72	9.5	46	6.2	54	7.2	70	9.2	61	8.9
decesso overdose	1	0.1	1	0.1	4	0.5	5	0.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0
oppioidi	501	64.9	528	69.7	494	65.2	500	67.5	526	70.5	537	70.6	501	72.8
di cui eroina	477	61.8	491	64.8	465	61.3	484	65.3	494	66.2	519	68.2	477	69.3
Cocaina	312	40.4	295	38.9	249	32.8	222	30.0	182	24.4	203	26.7	295	42.9
di cui solo cocaina	160	20.7	153	20.2	139	18.3	131	17.7	107	14.3	106	13.9	104	15.1
Cannabis	142	18.4	173	22.8	157	20.7	118	15.9	80	10.7	74	9.7	110	16.0
di cui solo cannabis	54	7.0	59	7.8	60	7.9	59	8.0	44	5.9	26	3.4	22	3.2
altre sostanze illegali***	71	9.2	77	10.2	74	9.8	69	9.3	67	9.0	75	9.9	82	11.9
benzodiazepine	14	1.8	17	2.2	10	1.3	14	1.9	15	2.0	11	1.4	16	2.3
anche altri farmaci**	14	1.8	14	1.8	11	1.5	11	1.5	23	3.1	29	3.8	29	4.2
anche Alcol	99	12.8	92	12.1	87	11.5	95	12.8	83	11.1	87	11.4	105	15.3
uso vena	115	14.9	117	15.4	115	15.2	117	15.8	126	16.9	132	17.3	100	14.5
Ospedale	46	6.0	43	5.7	35	4.6	34	4.6	39	5.2	43	5.7	26	3.8
Pronto soccorso	100	13.0	107	14.1	145	19.1	122	16.5	115	15.4	107	14.1	82	11.9
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3.3	29	4.2
SERT	634	82.1	657	86.7	616	81.3	620	83.7	618	82.8	623	81.9	539	78.3
di cui anche Carcere	368	47.7	405	53.4	380	50.1	423	57.1	392	52.5	369	48.5	344	50.0
di cui anche Unità Mobile Metadone	111	14.4	120	15.8	80	10.6	77	10.4	85	11.4	105	13.8	81	11.8
Europa Est	161	20.9	145	7.2	130	6.5	130	6.5	137	6.8	146	7.3	130	6.5
Altri paesi europei	73	9.5	77	9.9	91	12.0	78	10.5	90	12.1	102	13.4	95	13.8
Asia	47	6.1	47	6.0	46	6.1	50	6.7	40	5.4	39	5.1	38	5.5
Africa Mediterranea	417	54.0	438	21.7	420	20.9	424	21.1	412	20.5	413	20.5	368	18.3
Altra Africa	30	3.9	23	1.1	27	1.3	22	1.1	27	1.3	24	1.2	23	1.1
America Latina	33	4.3	37	1.8	28	1.4	26	1.3	30	1.5	29	1.4	28	1.4
Tunisia	208	26.9	230	29.5	206	27.2	201	27.1	181	24.3	168	22.1	140	20.3
Marocco	159	20.6	157	20.1	158	20.8	166	22.4	161	21.6	168	22.1	145	21.1
Algeria	49	6.3	50	6.4	55	7.3	57	7.7	68	9.1	76	10.0	83	12.1
Romania	36	4.7	37	4.7	28	3.7	33	4.5	31	4.2	28	3.7	19	2.8
Albania	27	3.5	32	4.1	31	4.1	25	3.4	19	2.5	31	4.1	27	3.9

Tab. 3 – Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" (1) contatti. Periodo 2004-2014

	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%	2008	%	2007	%	2006	%	2005	%	2004	%
Totale	751		737		738		828		837		898		1065		1050		1265		1148		1064	
età media	35.3		32.2		33.9		35.5		35.7		35.0		34.6		36.4		41.5		31.6		31.1	
femmine	155	20.6	128	17.4	142	19.2	197	23.8	213	25.4	194	21.6	259	24.3	248	23.6	313	24.7	224	19.5	190	17.9
non nativi	246	32.8	239	32.4	261	35.4	265	32.0	271	32.4	239	26.6	297	27.9	324	30.9	289	22.8	320	27.9	274	25.8
residenti Bologna	214	28.5	186	25.2	182	24.7	213	25.7	223	26.6	197	21.9	259	24.3	309	29.4	398	31.5	251	21.9	253	23.8
res. area metropolitana	441	58.7	417	56.6	347	47.0	448	54.1	421	50.3	441	49.1	531	49.9	522	49.7	697	55.1	517	45.0	462	43.4
res. fuori area metropolitana	292	38.9	299	40.6	376	50.9	379	45.8	387	46.2	423	47.1	514	48.3	479	45.6	548	43.3	599	52.2	562	52.8
SFD	46	6.1	24	3.3	25	3.4	17	2.1	54	6.5	44	4.9	77	7.2	59	5.6	40	3.2	56	4.9	99	9.3
sup/laurea	132	17.6	114	15.5	111	15.0	141	17.0	155	18.5	158	17.6	174	16.3	124	11.8	148	11.7	153	13.3	188	17.7
non lavora	213	28.4	200	27.1	259	35.1	288	34.8	326	38.9	314	35.0	159	14.9	358	34.1	392	31.0	458	39.9	90	8.5
studia	18	2.4	28	3.8	15	2.0	28	3.4	37	4.4	28	3.1	33	3.1	26	2.5	27	2.1	32	2.8	30	2.8
EpaC+	35	4.7	20	2.7	31	4.2	33	4.0	36	4.3	31	3.5	26	2.4	38	3.6	61	4.8	46	4.0	51	4.8
HIV+	7	0.9	4	0.5	5	0.7	1	0.1	5	0.6	5	0.6	4	0.4	5	0.5	10	0.8	10	0.9	14	1.3
Decesso overdose	9	1.2	5	0.7	7	0.9	3	0.4	2	0.2	3	0.3	8	0.8	10	1.0	20	1.6	11	1.0	10	0.9
oppioidi	353	47.0	248	33.6	325	44.0	379	45.8	385	46.0	488	54.3	542	50.9	514	49.0	510	40.3	582	50.7	634	59.6
di cui eroina	239	31.8	193	26.2	269	36.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cocaina	238	31.7	208	28.2	182	24.7	177	21.4	159	19.0	268	29.8	342	32.1	327	31.1	380	30.0	454	39.5	485	45.6
solo cocaina	166	22.1	159	21.6	139	18.8	141	17.0	120	14.3	132	14.7	174	16.3	155	14.8	198	15.7	210	18.3	185	17.4
Cannabis	205	27.3	235	31.9	161	21.8	126	15.2	96	11.5	137	15.3	150	14.1	183	17.4	184	14.5	229	19.9	191	18.0
Solo cannabis	125	16.6	151	20.5	111	15.0	95	11.5	67	8.0	51	5.7	74	6.9	65	6.2	76	6.0	113	9.8	99	9.3
altre sostanze illegali***	169	22.5	169	22.9	180	24.4	206	24.9	270	32.3	259	28.8	345	32.4	300	28.6	469	37.1	253	22.0	153	14.4
benzodiazepine	6	0.8	10	1.4	15	2.0	0	0.0	38	4.5	17	1.9	42	3.9	12	1.1	12	0.9	15	1.3	12	1.1
anche Alcol	130	17.3	121	16.4	138	18.7	129	15.6	75	9.0	156	17.4	198	18.6	140	13.3	251	19.8	172	15.0	176	16.5
anche altri farmaci**	54	7.2	21	2.8	23	3.1	62	7.5	135	16.1	63	7.0	99	9.3	51	4.9	33	2.6	39	3.4	39	3.7
uso vena	75	10.0	47	6.4	98	13.3	98	11.8	105	12.5	103	11.5	163	15.3	157	15.0	177	14.0	208	18.1	239	22.5
Carcere	119	15.8	123	16.7	196	26.6	193	23.3	177	21.1	197	21.9	214	20.1	242	23.0	262	20.7	313	27.3	228	21.4
Ospedale	171	22.8	73	9.9	82	11.1	133	16.1	188	22.5	101	11.2	78	7.3	94	9.0	109	8.6	116	10.1	51	4.8
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	22	2.6	73	8.1	92	8.6	74	7.0	69	5.5	143	12.5	205	19.3
Unità Mobile Metadone	58	7.7	27	3.7	0	0.0	30	3.6	61	7.3	33	3.7	46	4.3	36	3.4	67	5.3	60	5.2	74	7.0
Sert	369	49.1	333	45.2	370	50.1	450	54.3	466	55.7	459	51.1	480	45.1	494	47.0	500	39.5	581	50.6	546	51.3
Pronto soccorso	232	30.9	348	47.2	307	41.6	271	32.7	195	23.3	261	29.1	190	17.8	112	10.7	125	9.9	263	22.9	200	18.8

(1) nuovi: soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 4 – Consumatori problematici di eroina. Caratteristiche "nuovi" (1) contatti. Periodo 2013-2015

	2015	%	2014	%	2013	%
totale	214		239		193	
età media	33.6		34.4		31.4	
maschi	179	83.6	191	79.9	165	85.5
femmine	35	16.4	48	20.1	28	14.5
nativi	129	60.3	138	57.7	111	57.5
non nativi	85	39.7	101	42.3	82	42.5
residenti area metropolitana	90	42.1	98	41.0	63	32.6
residenti fuori area metropolitana	112	52.3	136	56.9	114	59.1
Cocaina	69	32.2	65	27.2	46	23.8
Cannabinoidi	15	7.0	31	13.0	40	20.7
altre sostanze illegali***	6	2.8	19	7.9	2	1.0
benzodiazepine	4	1.9	0	0.0	1	0.5
anche altri farmaci**	13	6.1	11	4.6	3	1.6
anche Alcol	13	6.1	16	6.7	7	3.6
uso Vena	53	24.8	73	30.5	47	24.4
Ospedale	6	2.8	8	3.3	5	2.6
Decesso overdose	8	3.7	9	3.8	5	2.6
Pronto Soccorso	21	9.8	56	23.4	23	11.9
Sert	191	89.3	203	84.9	171	88.6
Unità Mobile Metadone	42	19.6	58	24.3	26	13.5
Carcere	52	24.3	62	25.9	61	31.6
	2015	%	2014	%	2013	%
totale	214		239		193	

(1) nuovi: soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 5 – Caratteristiche soggetti con problemi alcol correlati. Periodo 2009-2015

	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%
Totale	2639		3158		2823		2784		2633		2906		2857	
nuovi accessi	1059	40.1	1680	53.2	1288	45.6	1284	46.1	1214	46.1	933	32.1	1058	37.0
età media	48.8		47.9		47.1		47.9		47.6		46.7		46.0	
maschi	1975	74.8	2322	73.5	2114	74.9	2081	74.7	1997	75.8	2181	75.1	2160	75.6
femmine	664	25.2	836	26.5	709	25.1	703	25.3	636	24.2	725	24.9	697	24.4
nativi	2009	76.1	2349	74.4	2113	74.8	2085	74.9	2030	77.1	2304	79.3	2295	80.3
non nativi	630	23.9	809	25.6	710	25.2	699	25.1	603	22.9	602	20.7	562	19.7
residenti area metropolitana	2203	83.5	2505	79.3	2261	80.1	2243	80.6	2138	81.2	2389	82.2	2289	80.1
residenti fuori area metropolitana	410	15.5	628	19.9	493	17.5	533	19.1	495	18.8	478	16.4	532	18.6
Senza fissa dimora (SFD)	58	2.2	76	2.4	72	2.6	47	1.7	45	1.7	124	4.3	111	3.9
Alcolisti SerT	1049	39.7	1035	32.8	1022	36.2	943	33.9	951	36.1	1071	36.9	1029	36.0
Tossicodipendente con abuso	200	7.6	181	5.7	182	6.4	171	6.1	184	7.0	175	6.0	187	6.5
Carcere	104	3.9	73	2.3	58	2.1	43	1.5	61	2.3	39	1.3	14	0.5
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	2.4	95	3.3
Ospedale	608	23.0	736	23.3	637	22.6	654	23.5	644	24.5	676	23.3	614	21.5
Pronto Soccorso	1162	44.0	1678	53.1	1490	52.8	1509	54.2	1259	47.8	796	27.4	858	30.0

Tab. 6 - Soggetti con problemi alcol correlati. Caratteristiche "nuovi" (1) contatti. Periodo 2009-2015

	nuovi 2015	%	nuovi 2014	%	nuovi 2013	%	nuovi 2012	%	nuovi 2011	%	nuovi 2010	%	nuovi 2009	%
Totale	1059		1680		1288		1284		1214		933		1058	
Età media	46.0		45.9		43.6		45.0		44.3		44.6		44.4	
maschi	787	74.3	1218	72.5	947	73.5	942	73.4	908	74.8	687	73.6	812	76.7
femmine	272	25.7	462	27.5	341	26.5	342	26.6	306	25.2	246	26.4	246	23.3
nativi	753	71.1	1158	68.9	858	66.6	851	66.3	831	68.5	620	66.5	743	70.2
non nativi	306	28.9	522	31.1	430	33.4	433	33.7	383	31.5	313	33.5	315	29.8
residenti area metropolitana	791	74.7	1189	70.8	903	70.1	908	70.7	869	71.6	666	71.4	729	68.9
residenti fuori area metropolitana	258	24.4	481	28.6	332	25.8	375	29.2	343	28.3	249	26.7	311	29.4
SFD	12	1.1	12	0.7	14	1.1	8	0.6	2	0.2	25	2.7	18	1.7
Alcolisti SerT	171	16.1	183	10.9	179	13.9	161	12.5	153	12.6	141	15.1	158	14.9
Tossicodipendente con abuso concomitante di alcol SerT	28	2.6	25	1.5	22	1.7	17	1.3	21	1.7	14	1.5	19	1.8
Carcere	24	2.3	15	0.9	16	1.2	9	0.7	13	1.1	8	0.9	26	2.5
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2.0	15	1.4
Ospedale	264	24.9	431	25.7	266	20.7	277	21.6	324	26.7	311	33.3	341	32.2
Pronto Soccorso	680	64.2	1162	69.2	924	71.7	949	73.9	825	68.0	522	55.9	611	57.8

(1) nuovi: soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

Tab. 7 – Consumo problematico alcol. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2015

	2015	%	2014	%	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%
Totale	630		809		710		699		603		602		562	
nuovi (qualsiasi settore di contatto)	306	48.6	522	64.5	430	60.6	433	61.9	383	63.5	313	52.0	315	56.0
età media	40.5		39.6		39.4		39.3		39.2		38.2		38.5	
maschi	454	72.1	595	73.5	520	73.2	511	73.1	448	74.3	459	76.2	422	75.1
femmine	176	27.9	214	26.5	190	26.8	188	26.9	155	25.7	143	23.8	140	24.9
residenti area metropolitana	390	61.9	484	59.8	413	58.2	432	61.8	367	60.9	369	61.3	328	58.4
residenti fuori area metropolitana	223	35.4	308	38.1	240	33.8	262	37.5	236	39.1	213	35.4	219	39.0
Senza fissa dimora	21	3.3	28	3.5	32	4.5	22	3.1	23	3.8	39	6.5	27	4.8
oppioidi	31	4.9	31	3.8	26	3.7	32	4.6	33	5.5	71	11.8	83	14.8
Cocaina	42	6.7	34	4.2	22	3.1	21	3.0	15	2.5	32	5.3	57	10.1
solo cocaina	39	6.2	31	3.8	20	2.8	16	2.3	12	2.0	19	3.2	23	4.1
Cannabis	19	3.0	25	3.1	26	3.7	25	3.6	10	1.7	6	1.0	15	2.7
Solo cannabis	17	2.7	19	2.3	23	3.2	22	3.1	9	1.5	6	1.0	10	1.8
altre sostanze illegali***	16	2.5	26	3.2	26	3.7	31	4.4	24	4.0	25	4.2	38	6.8
benzodiazepine	5	0.8	12	1.5	11	1.5	8	1.1	2	0.3	3	0.5	11	2.0
anche altri farmaci**	31	4.9	25	3.1	17	2.4	23	3.3	13	2.2	13	2.2	34	6.0
Sert	204	32.4	196	24.2	193	27.2	164	23.5	153	25.4	172	28.6	147	26.2
Carcere	56	8.9	40	4.9	32	4.5	20	2.9	24	4.0	50	8.3	46	8.2
Ospedale	109	17.3	136	16.8	98	13.8	106	15.2	99	16.4	96	15.9	80	14.2
Tossicodipendente con abuso concomitante di alcol	38	6.0	34	4.2	31	4.4	24	3.4	28	4.6	74	12.3	82	14.6
Pronto soccorso	353	56.0	549	67.9	491	69.2	501	71.7	391	64.8	314	52.2	271	48.2
Area Disagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2.5	21	3.7
Unità Mobile Metadone	14	2.2	15	1.9	15	2.1	12	1.7	13	2.2	19	3.2	24	4.3
Area provenienza														
Europa Est	271	43.0	368	45.5	288	40.6	276	39.5	232	38.5	210	34.9	186	33.1
Europa Nord	5	0.8	12	1.5	12	1.7	14	2.0	12	2.0	19	3.2	14	2.5
Europa Ovest	47	7.5	46	5.7	46	6.5	49	7.0	38	6.3	54	8.8	59	10.5
Asia Medio Orientale	10	1.6	13	1.6	12	1.7	18	2.6	13	2.2	16	2.7	13	2.3
Asia Orientale	12	1.9	11	1.4	10	1.4	14	2.0	4	0.7	6	1.0	7	1.2
Regione Indiana	43	6.8	46	5.7	35	4.9	49	7.0	36	6.0	30	5.0	33	5.9
Altra Asia o Sud Est Asiatico	5	0.8	11	1.4	7	1.0	5	0.7	8	1.3	7	1.2	7	1.2
Africa Mediterranea	162	25.7	208	25.7	185	26.0	172	24.6	154	25.5	180	30.0	152	27.0
Altra Africa	40	6.3	45	5.6	36	5.1	38	5.4	46	7.6	39	6.5	43	7.7
America Latina	28	4.4	39	4.8	33	4.7	45	6.4	35	5.8	36	6.0	35	6.2

Tab. 8– Sequestri di stupefacenti e operazioni antidroga da parte delle Forze dell'Ordine nella provincia di Bologna.

Periodo 2004-2015

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
KG HEROINA	39.3	44.5	9.4	65.9	37.7	22.5	52.7	25.3	9.2	30.6	2.4	11.9
KG COCAINA	76.1	89.3	88.8	82.9	54.1	39.9	38.4	33.5	28.4	35.0	22.0	10.7
KG HASCISH	310.7	183.3	153.6	229.9	905.5	506.8	66.7	140.7	157.7	68.0	41.8	63.1
KG MARIJUANA	3.5	8.5	5.0	13.2	2.2	41.0	4.44	89.7	170.7	68.0	75.2	69.2
Operazioni	545	669	742	713	664	544	483	616	574	652	489	328
denunce	759	897	1202	1041	922	825	696	888	709	316	606	398
arresti	598	703	983	825	788	708	573	790	621	542	493	308
minori denunciati	50	38	45	29	22	23	14	17	11	12	9	15
non nativi	510	504	709	625	529	451	385	569	461	410	375	286

* i dati statistici riferiti al 2015 sono da considerare provvisori in attesa di consolidamento

Tab. 9– Accessi ai reparti di Pronto Soccorso per abuso di sostanze illegali: casi incidenti per anno

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Numero soggetti	686	806	777	453	416	516	256
% con più di un accesso	21.0	22.2	16.9	16.8	18.3	24.6	14.8
Caratteristiche							
% femmine	20.1	24.4	18.8	22.3	21.2	17.8	22.3
età media	35.7	36.3	35.7	36.7	37.5	34.0	36.3
% non residenti	35.9	32.1	34.0	30.2	25.7	38.2	33.6
% non nativi	30.6	24.6	23.8	19.0	17.8	26.7	19.9
% Europa Est	6.3	4.7	5.8	6.0	3.1	4.7	4.7
% Africa Mediterranea	14.3	12.2	11.1	7.1	9.4	13.0	6.3
Arrivo							
% arrivo di notte (dalle 20 alle 8)	49.3	41.6	50.5	39.3	43.0	48.3	42.2
% arrivo nel week end	40.4	36.7	39.3	32.7	33.2	37.2	30.1
% accesso coatto	8.3	6.3	4.8	3.1	3.6	8.9	3.9
% codice TRIAGE rosso	5.4	5.5	3.9	4.6	4.3	3.5	6.3
% rifiuta ogni trattamento/dimissione	2.5	3.0	2.7	2.9	3.1	2.9	2.0
% dimissione volontaria dal pronto	0.7	0.6	0.5	0.4	0.7	1.0	3.1
Sostanze							
% anche alcol	25.8	26.4	18.9	17.2	21.4	16.1	16.0
% anche psicofarmaci	7.3	9.2	7.1	6.6	5.3	5.2	6.3
% Oppioidi	23.2	28.0	40.4	53.9	54.8	41.5	63.7
% eroina	10.6	20.1	14.8	17.9	15.6	11.0	12.9
% Metadone	8.7	21.1	23.4	34.0	31.0	22.1	33.6
% Cocaina	26.4	19.1	22.1	20.8	20.2	23.1	12.5
% Cannabis	19.1	18.9	22.8	16.1	11.3	12.8	7.8
% Amfetamine	1.9	2.1	1.9	0.7	1.7	1.6	2.0
% sostanza non indicata	27.4	34.7	24.5	23.6	16.6	24.0	20.7
Altri disturbi correlati							
% disturbi sistema cardiocircolatorio	26.2	12.5	24.3	20.3	20.9	15.9	13.3
% disturbi apparato digerente	23.0	13.2	19.2	22.5	18.8	15.7	18.8
% disturbi psichici e comportamentali	36.0	17.4	24.3	21.4	20.9	23.3	20.3
% traumatismi	22.6	13.4	19.0	19.0	19.7	15.5	16.8
% Autolesione e tentato suicidio	6.3	4.1	5.1	3.5	3.8	2.7	5.5
% Omicidio e lesioni da terzi	2.8	2.4	4.1	4.6	2.4	3.5	1.6
% Incidenti stradali	6.4	3.7	4.8	4.0	6.3	4.5	5.1
% Cadute accidentali	6.4	2.7	3.9	4.9	6.7	4.1	4.3
% Overdose	7.7	5.3	6.2	0.0	0.0	3.9	0.0

Tab. 10 – Accessi ai reparti di Pronto Soccorso per abuso di alcol: casi incidenti per anno

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Soggetti	2004	2426	2056	1386	1247	1570	1656
% Più di un accesso	20.7	19.4	19.4	21.4	20.9	24.6	20.3
% Femmine	28.6	28.1	26.7	25.0	25.3	29.0	27.5
età media	43.8	43.3	42.2	45.3	43.8	39.2	41.7
% non nativi	30.9	34.6	33.1	33.8	30.8	38.0	31.5
% Europa Est	12.4	14.4	14.1	13.8	12.5	14.4	11.2
% Africa Mediterranea	7.3	8.3	7.7	8.0	8.4	8.6	7.7
% non residenti	28.6	31.4	31.4	27.3	30.6	36.7	34.8
Arrivo % arrivo di notte (dalle 20 alle 8)	60.1	33.8	59.0	56.3	59.3	26.2	60.4
% arrivo nel week end	46.3	27.0	44.8	44.8	48.0	20.6	46.1
% accesso coatto	4.1	8.7	8.6	5.1	4.7	7.6	6.8
Triage % Codice TRIAGE rosso	3.4	3.1	2.9	3.0	1.8	3.0	2.6
Esito % rifiuta ogni trattamento	3.5	3.0	3.2	4.6	3.2	3.1	2.2
% dimissione volontaria dal pronto soccorso	0.6	0.7	2.8	3.6	1.8	1.5	2.7
% successivo ricovero ospedaliero	7.3	11.3	2.9	1.8	1.5	2.0	2.1
Disturbi alcol-correlati % Dipendenza	36.1	19.7	25.5	23.3	22.4	23.4	25.4
% dipendenza	33.9	17.7	23.6	21.9	20.4	22.3	23.8
% sindrome astinenza	1.7	1.1	1.6	1.1	1.9	1.2	0.9
% psicosi alcolica	2.0	1.4	1.0	1.0	0.9	0.5	1.6
% Abuso	60.1	73.1	66.2	69.6	67.8	67.8	66.6
% abuso/uso problematico	56.3	70.1	62.5	66.4	64.0	55.9	53.3
% intossicazione acuta	6.7	2.7	3.4	3.0	3.7	11.4	13.0
% coma etilico	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	1.3	1.1
% Danni alcol correlati	8.4	11.2	9.5	10.0	10.2	9.3	9.7
% patologie epatiche	4.2	7.7	7.1	7.7	8.3	7.6	7.9
% patologie organiche	4.4	4.6	3.0	3.2	2.5	2.5	2.4
Uso sostanze % Almeno un'altra sostanze psicoattiva illegale	9.1	8.7	11.5	8.2	7.6	8.3	6.5
% Cannabis	2.0	2.1	1.9	1.9	1.0	1.1	0.8
% Cocaina	2.6	1.6	1.8	0.9	1.1	1.2	1.0
% Oppioidi	2.5	3.2	2.2	1.7	2.6	2.2	2.2
% Anche psicofarmaci	7.6	4.7	3.8	3.4	3.1	3.4	5.0
Complicazioni % Traumatismi	29.7	29.3	30.2	28.8	29.8	23.2	24.0
% Autolesione e tentato suicidio	5.1	3.1	4.1	4.3	3.7	2.4	3.1
% Omicidio e lesioni da terzi	4.8	5.8	5.0	3.4	3.4	3.2	3.4
% Incidenti stradali	6.6	7.2	7.4	7.1	6.5	5.8	6.1
% Cadute accidentali	13.6	11.8	12.5	12.6	14.2	10.0	9.8

Tab. 11 – Ricoveri di residenti per abuso/dipendenza sostanze illegali: casi incidenti

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Soggetti	208	220	169	185	201	221	190
Più di un ricovero nell'anno	22.1	11.8	11.8	10.3	10.4	17.2	17.4
Femmine	31.7	23.2	25.4	33.0	44.3	40.3	43.7
età media	43.16	42.93	41.27	42.59	44.25	46.81	45.38
non nativi	14.9	11.4	16.0	13.5	10.9	10.0	7.9
Europa Est	4.8	2.3	2.4	1.1	4.0	2.3	2.1
Asia	3.4	2.7	1.2	1.1	0.0	0.9	0.0
Africa Mediterranea	3.4	2.3	4.1	5.9	2.5	2.3	1.1
anche alcol	12.0	17.7	11.8	12.4	6.0	6.3	16.3
anche psicofarmaci	3.4	3.6	2.4	5.4	10.9	25.8	2.1
Soggetti	208	220	169	185	201	221	190
Dipendenza da droghe	30.8	37.7	40.2	40.5	36.8	34.4	46.8
Dipendenza da cannabinoidi	2.4	2.3	4.7	1.6	1.0	0.5	0.5
Dipendenza da cocaina	6.7	4.1	7.7	4.9	5.5	3.6	5.8
Dipendenza da oppioidi	14.4	25.0	21.9	25.9	19.4	14.9	20.5
Combinazioni di sostanze oppioidi con altre	3.8	3.6	2.4	3.2	4.0	4.1	4.7
Dipendenza da altre sostanze non indicate	4.8	4.1	3.0	4.3	5.0	8.1	34.7
Abuso di droghe senza dipendenza	53.4	49.1	49.1	42.2	42.3	44.3	43.7
Abuso di cannabinoidi	13.5	11.4	16.6	8.1	8.0	6.3	7.4
Abuso di cocaina	10.6	10.9	9.5	7.6	7.0	6.8	5.8
Abuso di oppioidi	10.1	10.5	5.9	12.4	5.5	9.0	8.4
Altri abusi misti non specificati	21.2	16.4	16.6	11.9	18.4	22.2	21.6
Psicosi indotte da droghe	14.4	13.6	13.6	15.7	10.0	10.9	10.0
Intossicazione patologica	4.3	4.5	1.8	5.4	4.5	4.5	2.1
Disturbi psichici vari	9.6	7.7	8.9	7.6	4.5	4.5	0.0
Avvelenamenti	4.3	4.1	2.4	5.9	12.4	15.8	2.1

Tab. 12 – Ricoveri di residenti per abuso/dipendenza alcol: casi incidenti

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Soggetti	558	696	568	587	587	613	653
% Più di un ricovero nell'anno	23.7	19.8	22.5	27.3	22.8	29.5	23.7
% Femmine	22.8	25.4	23.8	25.2	23.2	24.5	25.6
età media	57.72	56.28	56.59	56.63	57.85	56.92	57.02
% non nativi	15.8	16.2	12.1	13.5	12.1	11.4	10.6
% Europa Est	8.2	9.6	6.3	5.3	4.8	4.7	4.6
% Asia	2.5	2.2	1.8	1.9	2.2	2.0	1.7
% Africa Mediterranea	2.0	2.6	1.9	3.4	1.5	1.5	1.2
% Dipendenza	24.4	37.2	32.6	26.9	28.3	30.2	31.2
% psicosi alcolica	4.3	4.7	6.3	5.5	7.8	7.2	6.0
% Abuso	22.8	21.1	19.9	22.7	20.4	17.8	18.8
% abuso/uso problematico	21.7	20.1	19.4	22.5	20.1	17.5	17.3
% alcolemia elevata	0.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% effetti tossici dell'alcol	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3	1.5
% Danni correlati	59.0	48.9	54.4	56.2	57.2	58.9	53.8
% patologie epatiche	55.6	47.4	51.4	54.5	54.5	54.8	51.8
% patologie organiche	4.7	2.6	3.7	2.6	4.1	5.2	3.5
% anche sostanze illegali	5.2	5.7	3.5	3.2	2.6	2.9	3.8
% Anche psicofarmaci	2.3	2.9	1.8	2.2	0.7	2.0	1.7

Tab. 13 - Giocatori d'azzardo patologici in carico al SERT. Periodo 2009-2015

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Totale	32	38	36	55	84	145	171
% nuovi	46.9	21.1	41.7	54.5	66.7	55.9	50.3
età media	47.5	46.9	46.1	45.7	49.2	48.5	45.1
% femmine	18.8	10.5	19.4	20.0	26.2	22.8	18.7
% non nativi	6.3	7.9	8.3	7.3	11.9	11.7	11.1
% residenti fuori	3.1	5.3	5.6	5.5	8.3	9.0	5.8
% coniugato	53.1	60.5	55.6	34.5	38.1	35.2	32.7
% media sup/laurea	50.0	47.4	52.8	47.3	50.0	46.9	44.0
% disoccupato	12.5	13.2	11.1	91.0	13.1	11.7	16.4
durata media programma in mesi	39	35	20	21	9	6	8
% programma completato	28.1	28.9	19.4	1.8	0.0	3.4	3.5
% dimissione concordata	12.5	7.9	5.6	3.6	3.6	6.9	4.7
% passaggio altra struttura	3.1	7.9	8.3	0.0	0.0	1.4	0.6
% abbandono	6.3	7.9	8.3	3.6	1.2	5.5	5.8
% chiusura d'ufficio	25.0	26.3	19.4	9.1	31.0	20.7	22.8
% programma in corso	21.9	18.4	36.1	80.0	64.3	62.1	62.0
% altre dipendenze	25.0	26.3	30.6	25.5	10.7	7.0	11.1
% alcol	18.8	18.4	25.0	14.5	4.8	2.8	1.8
% cocaina	0.0	2.6	5.6	7.3	1.2	1.4	0.6
% eroina	3.1	2.6	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
% tabacco	3.1	2.6	0.0	1.8	2.4	2.1	0.6
% altro	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.7	0.0

Tab 14 - Utenti GAP 2015: esito del programma terapeutico per durata del trattamento

	da 0-6 mesi	da 6 a 12 mesi	>12	Totale
Numero utenti	64	50	57	171
In corso	40.6	56.0	71.9	55.6
Completato	0.0	4.0	5.3	2.9
Dimesso	4.7	4.0	3.5	4.1
Passaggio altra str.	1.6	0.0	0.0	0.6
Arresto	0.0	0.0	0.0	0.0
Decesso	1.6	0.0	0.0	0.6
Abbandono	4.7	4.0	3.5	4.1
Fuga/espulsione	0.0	0.0	0.0	0.0
Chiusura d'ufficio	46.9	32.0	15.8	32.2

Tab. 15– Nuovi utenti SERT con dipendenza da sostanze illegali

		2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Zona di nascita	Soggetti	386	386	362	397	426	506	530
	% Femmine	13.7	15.3	11.0	14.4	13.1	13.0	14.7
	età media	32.1	32.1	31.6	31.6	31.7	31.3	31.3
	% non residenti	39.4	44.3	39.5	52.1	48.6	49.4	49.8
	% Senza Fissa Dimora (SFD)	7.3	10.1	5.0	3.3	3.5	5.5	2.6
	% non nativi	35.5	39.9	37.3	44.1	38.7	38.1	33.2
	% Europa Est	7.5	7.0	6.1	7.8	6.1	4.9	5.3
	% Africa Mediterranea	21.2	24.4	23.2	28.5	25.4	24.5	20.9
	% Altra Africa	1.3	1.6	0.8	0.5	1.4	1.6	0.8
Titolo di studio	% elementari/media inferiore	71	70.5	67.7	74.6	71.8	67.6	69.4
	% media superiore/laurea	24.9	26.2	26.5	22.7	21.8	25.9	27.5
Situazione abitativa	% dimora stabile	58.0	52.6	57.2	40.8	47.2	48.6	46.8
Situazione lavorativa	% lavoro regolare	32.6	31.3	33.4	24.9	28.4	27.7	33.2
	% studente	9.6	5.4	8.0	4.5	6.3	7.5	5.3
HIV	% Positivo	1.3	2.1	1.7	1.3	1.2	1.4	1.5
Epatite C	% Positivo	2.8	5.7	4.7	5.0	5.6	6.3	7.9
Sostanza primaria	% Oppioidi	51.3	54.9	53.0	62.7	61.7	67.0	70.4
	% eroina	49.2	52.1	50.8	59.4	59.9	66.2	69.8
	% Metadone	1.8	1.8	1.4	2.5	1.2	0.8	0.2
	% Cocaina	31.3	27.2	26.5	20.2	23.5	21.3	21.7
	% Cannabis	16.1	16.8	19.1	16.1	14.1	11.3	7.2
Modalità eroina primaria	% endovenosa	24.7	31.8	28.8	42.4	31.0	33.7	38.4
	% nasale	13.7	15.4	18.5	11.9	14.5	9.0	8.1
	% fumata/inalata	60.0	47.8	48.4	44.1	51.4	54.3	51.1
Modalità cocaina primaria	endovenosa	1.7	2.9	0.0	0.0	1.0	3.7	5.2
	nasale	76.0	78.1	77.1	75.0	69.0	75.0	67.0
	fumata/inalata	19.8	16.2	18.8	23.8	28.0	19.4	27.0

Tab. 16 – Nuovi utenti SERT con dipendenza da alcol

		2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Età	Soggetti	226	229	256	216	200	213	213
	Femmine	26.5	31.0	32.0	22.2	31.0	20.7	22.5
	età media	44.9	45.3	45.4	46.6	45.6	43.9	44.9
Zona di nascita	non residenti	10.6	5.2	7.8	6.0	4.0	12.7	8.0
	non nativi	23.9	25.3	28.1	21.8	22.0	27.7	19.2
	Europa Est	12.8	11.8	12.9	8.8	12.0	10.8	5.2
Titolo di studio	Africa Mediterranea	4.4	6.6	7.8	6.5	5.0	10.8	6.1
	elementari/media inferiore	63.7	58.5	62.5	56.9	63.0	68.5	67.1
Situazione abitativa	media superiore/laurea	29.2	34.5	31.6	37.0	33.5	23.5	31.5
	dimora stabile	80.1	85.6	81.6	81.9	81.0	73.2	88.3
Situazione lavorativa	lavora	49.1	49.8	48.4	41.7	51.0	47.4	54.0
	non lavora	45.1	45.4	49.6	56.5	46.5	45.1	46.0
Epatite C	studente	0.9	1.7	0.4	1.4	0.5	2.3	0.0
	Positivo	4.9	7.0	4.3	5.1	4.5	8.5	4.2
Altre dipendenze	Test effettuato	63	70	68	68	66	63	54
	Gioco d'azzardo	2.2	1.7	0.8	0.9	0.5	0.0	0.5

Tab. 17 – Consumo problematico sostanze psicoattive. Prevalenza per 1.000 residenti per sesso e per nazionalità - età 15/64. Periodo 2004-2014

	Maschi							Femmine						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Sostanze Illegali	1.10	1.11	1.24	0.97	1.17	1.14	1.13	0.28	0.34	0.27	0.29	0.36	0.43	0.35
Alcol	1.69	1.92	1.91	1.85	1.83	1.58	1.72	0.61	0.79	0.73	0.71	0.64	0.52	0.62
Oppioidi	0.28	0.31	0.31	0.37	0.45	0.44	0.61	0.11	0.16	0.09	0.11	0.13	0.14	0.20
Cocaina	0.48	0.48	0.57	0.34	0.39	0.46	0.33	0.10	0.09	0.08	0.05	0.07	0.07	0.08
Cannabis	0.36	0.42	0.50	0.36	0.32	0.28	0.29	0.07	0.08	0.09	0.06	0.05	0.04	0.04

	Nativi							Non nativi						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Sostanze Illegali	0.64	0.66	0.69	0.54	0.71	0.72	0.70	0.92	1.07	1.07	1.13	1.09	1.23	1.01
Alcol	1.00	1.11	1.09	1.02	0.98	0.82	0.94	1.96	2.70	2.62	2.79	2.80	2.70	2.85
Oppioidi	0.18	0.22	0.19	0.22	0.27	0.26	0.39	0.27	0.29	0.26	0.32	0.40	0.45	0.54
Cocaina	0.06	0.05	0.07	0.05	0.04	0.04	0.03	1.63	1.68	1.81	1.09	1.46	1.82	1.56
Cannabis	0.05	0.06	0.06	0.07	0.04	0.03	0.02	1.17	1.33	1.67	1.06	1.15	1.11	1.35

Tab. 18 – Consumo problematico sostanze psicoattive. Incidenza per 1.000 residenti per sesso e per nazionalità – età 15/64. Periodo 2009-2015

	Maschi							Femmine						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Sostanze Illegali	7.21	7.26	7.15	6.76	7.16	7.52	7.34	1.83	1.86	1.85	1.91	2.06	2.23	2.14
Alcol	4.87	5.40	5.02	4.84	4.78	5.52	5.35	1.70	2.07	1.83	1.75	1.54	1.95	1.88
Oppioidi	5.09	5.31	5.02	5.14	5.35	5.51	5.50	1.46	1.54	1.44	1.56	1.57	1.60	1.62
Cocaina	2.14	2.04	1.91	1.62	1.67	1.89	2.07	0.50	0.42	0.37	0.34	0.31	0.39	0.43
Cannabis	1.10	1.08	1.09	0.94	0.90	0.85	0.91	0.22	0.21	0.19	0.17	0.13	0.14	0.21

	Nativi							Non nativi						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Sostanze Illegali	4.66	4.70	4.70	4.54	4.77	5.00	4.82	3.52	3.45	3.16	2.92	3.40	3.83	3.85
Alcol	3.03	3.32	3.13	2.93	2.87	3.49	3.38	4.65	5.97	5.01	5.45	4.96	5.39	5.28
Oppioidi	3.48	3.63	3.47	3.59	3.65	3.43	3.67	1.95	2.06	1.71	1.74	2.11	1.88	2.49
Cocaina	1.34	1.26	1.16	0.99	1.02	1.18	1.25	1.14	0.95	0.95	0.92	0.76	0.81	1.17
Cannabis	0.64	0.63	0.64	0.54	0.05	0.52	0.56	0.70	0.71	0.64	0.64	0.47	0.38	0.54

Tab. 19: Area Metropolitana di Bologna. Periodo 2012-2015. Decessi per overdose e accessi al pronto soccorso per overdose: caratteristiche dei soggetti e rapporto con i servizi

	decessi per overdose				accessi al PS per overdose			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
	16	19	12	15	113	112	98	86
Età media	36.9	38.7	39.4	44.1	36.4	37.9	38.0	38.2
% Femmine	6.3	5.3	8.3	0.0	24.8	10.7	11.2	11.6
% Non residenti	31.3	42.1	33.3	40.0	47.8	55.4	45.9	51.8
% Non nativi	31.3	21.1	8.3	6.7	12.4	24.1	19.4	22.4
% sconosciuti al Sert	43.8	26.3	33.3	26.7	87.6	73.2	46.9	52.9

Tab 20 – Il territorio: tassi standardizzati di mortalità droga-correlati e alcol-correlati per 100.000 residenti*

	Sostanze illegali**				Alcol***			
	Bologna	CI95%	RER (no Bo)	CI95%	Bologna	CI95%	RER (no Bo)	CI95%
2006	2.30	1.20-3.30	1.30	0.80-1.70	7.20	5.20-9.30	5.90	4.90-6.90
2007	1.20	0.50-1.90	1.10	0.70-1.50	3.40	2.00-4.80	1.40	0.70-2.10
2008	1.50	0.70-2.40	0.90	0.50-1.20	2.80	1.60-4.10	2.50	2.50-3.20
2009	1.70	0.80-2.70	0.80	0.50-1.10	4.20	2.60-5.80	4.90	4.00-5.90
2010	1.40	0.60-2.20	0.60	0.30-0.90	2.80	1.50-4.10	2.00	1.50-2.60
2011	1.50	0.70-2.40	0.70	0.40-1.00	3.10	1.80-4.40	1.80	1.30-2.40
2012	2.40	1.30-3.50	0.60	0.30-0.90	3.40	2.00-4.80	2.20	1.60-2.80
2013	1.70	0.80-2.60	0.90	0.50-1.40	2.90	1.60-4.20	2.00	1.40-2.60
	Regione ER	CI95%	Italia (no RER)	CI95%	Regione	CI95%	Italia (no RER)	CI95%
2006	1.50	1.10-1.90	1.10	1.00-1.20	6.20	5.30-7.10	2.90	2.70-3.10
2007	1.10	0.80-1.50	1.20	1.00-1.30	2.90	2.30-3.50	2.90	2.70-3.00
2008	1.00	0.70-1.30	1.10	1.00-1.20	2.60	2.00-3.20	2.90	2.70-3.00
2009	1.00	0.70-1.30	1.00	0.90-1.10	4.80	3.90-5.60	5.00	4.80-5.20
2010	0.80	0.50-1.10	0.90	0.80-0.90	2.20	1.70-2.70	2.70	2.60-2.90
2011	0.90	0.60-1.20	0.80	0.70-0.90	2.10	1.60-2.60	2.70	2.50-2.80
2012	1.00	0.70-1.40	0.90	0.80-1.00	2.50	1.90-3.00	2.40	2.30-2.60
2013	1.10	0.70-1.50	0.80	0.80-0.90	2.20	1.70-2.80	2.20	2.10-2.30

* Standard Italia 2011

** 15/64 anni

*** 15/74 anni

(1) Drug-induced deaths: Opioid related disorders; Cannabis related disorders; Sedative, hypnotic, or anxiolytic related disorders; Cocaine related disorders; Other stimulant related disorders; Hallucinogen related disorders; Inhalant related disorders; Other psychoactive substance related disorders; Abuse of non-psychoactive substances; Accidental poisoning by and exposure to noxious substances; Intentional self-poisoning by and exposure to nonopioid analgesics, antipyretics and antirheumatics; Intentional self-poisoning by and exposure to antiepileptic, sedative-hypnotic, antiparkinsonism and psychotropic drugs, not elsewhere classified; Intentional self-poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics [hallucinogens], not elsewhere classified; Intentional self-poisoning by and exposure to other drugs acting on the autonomic nervous system; Intentional self-poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substance; Assault by drugs, medicaments and biological substances; Poisoning by and exposure to nonopioid analgesics, antipyretics and antirheumatics, undetermined intent; Poisoning by and exposure to antiepileptic, sedative-hypnotic, antiparkinsonism and psychotropic drugs, not elsewhere classified, undetermined intent; Poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics [hallucinogens], not elsewhere classified, undetermined intent; Poisoning by and exposure to other drugs acting on the autonomic nervous system, undetermined intent; Poisoning by and exposure to other and unspecified drugs, medicaments and biological substances, undetermined intent.

(2) All alcohol-related deaths: Alcohol-induced pseudo-Cushing's syndrome; Alcohol related disorders; Degeneration of nervous system due to alcohol; Alcoholic polyneuropathy; Alcoholic myopathy; Alcoholic cardiomyopathy; Alcoholic gastritis; Alcoholic liver disease; Alcohol-induced chronic pancreatitis; Finding of alcohol in blood; Accidental poisoning by and exposure to alcohol; Intentional self-poisoning by and exposure to alcohol; Poisoning by and exposure to alcohol, undetermined intent.

Randall, D., Roxburgh, A., Gibson, A., & Degenhardt, L. (2009). Mortality among people who use illicit drugs: A toolkit for classifying major causes of death. NDARC Technical Report No. 301. Sydney: National Drug and Alcohol Research Centre, University of New South Wales

Tab 21 – Stima del sommerso

Stima sommerso	2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009	
	Stima	IC 95%												
Oppioidi	3480	2844-4115	4364	3593-5135	3206	2746-3667	2986	2652-3319	2878	2567-3188	2864	2542-3185	3076	2705-3447
Cocaina	1288	1016-1559	1341	1005-1677	902	732-1071	767	621-913	858	664-1051	967	755-1178	919	772-1066
Cannabis	709	493-925	1043	581-1505	896	559-1233	544	357-730	592	354-829	543	343-743	890	446-1334
Alcol	3345	2847-3842	3986	3387-4585	3553	3033-4072	3445	2916-3974	3747	3116-4377	4139	3482-4797	3362	2866-3859

Sconosciuti/conosciuti	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
oppioidi	1.75	2.16	1.59	1.43	1.32	1.30	1.38
cocaina	1.87	2.14	1.60	1.50	1.73	1.61	1.32
cannabis	2.51	4.01	3.42	2.26	2.34	2.08	3.01
alcol	3.80	4.43	3.94	4.19	4.56	4.48	3.74

Tab 22 - Deceduti per overdose in Emilia Romagna, ovunque residenti*

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997
Totale	23	23	29	23	19	13	28	36	38	53	38	41	33	49	77	109	120	93	106
Maschi	20	23	27	21	18	11	22	29	31	50	32	35	27	31	63	97	104	84	94
Femmine	3	0	2	2	1	2	6	7	7	3	6	6	6	18	14	12	16	9	12
Nativi	20	21	23	19	17	13	26	27	33	43	35	33	33	46	64	98	111	88	103
Non nativi	3	2	6	4	2	0	2	9	5	10	3	8	0	3	13	11	9	5	3

Residenti nella provincia del decesso	19	17	18	18	15	8	25	23	30	36	32	27	24	40	52	74	87	82	99
Non residenti nella provincia del decesso	4	6	11	5	4	5	3	13	8	17	6	14	9	9	25	35	33	11	7
Di cui, Non residenti nella provincia del decesso, ma residenti in	0	1	2	1	1	1	0	1	2	2	1	6	2	2	3	12	14	11	7
Di cui, Non residenti nella provincia del decesso e non residenti	4	5	9	4	3	4	3	12	6	15	5	8	7	7	22	23	19	0	0

Provincia decesso	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997
Bologna	16	14	22	17	12	4	10	15	15	32	16	16	16	16	22	27	48	30	45
Modena	0	0	1	0	0	3	5	0	5	0	0	2	3	7	13	26	21	22	15
Parma	3	1	1	0	2	1	0	9	4	5	4	2	3	6	9	11	10	9	9
Ravenna	0	1	0	2	2	0	5	2	2	7	5	3	3	8	7	14	4	12	6
Reggio Emilia	0	1	2	3	1	2	4	2	4	2	2	7	4	5	4	5	11	10	11
Ferrara	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	6	5	1	1	8	10	7	0	11
Forlì Cesena	2	5	1	0	1	1	2	6	5	2	4	2	0	0	6	6	5	3	6
Piacenza	2	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	3	1	3	6	9	11	5	3
Rimini	0	0	1	0	1	1	0	1	0	3	1	1	2	3	2	1	3	2	0

Età media	42.3	40.3	37.9	39	37.9	38.5	38.9	36.2	37.6	35.5	38.2	33.8	34.2	34.3	34.2	32.5	32.4	32.7	30.4
età minima	23	27	16	21	26	25	21	22	20	21	24	19	18	19	16	17	19	18	17
età massima	55	56	50	54	46	47	55	62	57	52	57	49	62	52	63	60	54	59	63

*<http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/sanita/rem/analisi-statistica>